

Ambramicina lactancia®

USO VETERINÁRIO

Combinação antibiótica de aplicação intramamária durante a lactação.

Fórmula

Cloxacilina (sódica) 0,20 g
Ampicilina (sódica) 0,075 g
Veículo oleoso q.s.p. uma seringa 10 mL

Indicações

É indicado para controlar as mastites produzidas pelas seguintes bactérias:

Bactérias gram (+): *Staphylococcus aureus* (incluindo cepas resistentes à penicilina) *Streptococcus spp* (incluindo enterococcus); *Corynebacterium pyogenes*; *Clostridium perfringens*; *Cl. pseudotuberculosis*; *Listeria monocytogenes*; *Bacillus anthracis*.

Bactérias gram (-): *Haemophilus influenzae*; *Escherichia coli*; *Salmonella spp*; *Shigella spp*; *Proteus mirabilis*; *P. morgani*; *Brucella spp*; *Neisseria spp*; *Bordetella pertussis*.

Espécies de destino

Bovinos na lactação.

Dosagem, modo e via de administração

Bovinos: Um injetor por quarto, ou seja, 10 ml de Ambramicina Lactancia®, equivalentes a 75 mg de ampicilina sódica e 200 mg de cloxacilina sódica por quarto) a cada 12 horas. O tratamento completo inclui 3 doses.

Apresentação

Embalagem com 24 e 120 seringas de 10 ml.

BROUWER