

Carminativo Brouwer Premix PLUS

Para a prevenção e controle do meteorismo espumoso ou timpanismo nos bovinos.

Fórmula:

Álcool Láurico (*).....10,00 g

Monensina0,75 g

Excipiente vegetal, c.s.p 100,00 g

Indicações:

Carminativo Premix Plus Brouwer é indicado para a prevenção e controle do meteorismo espumoso nos bovinos. Dá proteção por 24 h.

Dosagem:

Recomenda-se, como dose mínima, administrar 8 g de produto para cada 100 kg de peso vivo por dia, só, misturado na ração ou com o suplemento mineral. Por exemplo, uma vaca leiteira de 500 kg de peso deve receber diariamente 40 g de produto, o que representa uma dose de 300 mg totais de monensina. Se o produto for administrado misturado com a ração, para calcular a quantidade do mesmo a ser incluído na preparação do alimento pode ser usada a seguinte fórmula:

$$\text{Quant de prod a adicionar(kg)} = \frac{\text{Quant.de alimento(kg)} \times \text{Dose diária(g)}}{\text{Consumo diário (kg)} \times 1000}$$

Onde:

A Quantidade de alimento é o peso do alimento que vai ser preparado no mixer (por exemplo, 1000 kg).

A Dose Diária é a dose em gramas que os animais mais pesados do lote devem receber (por exemplo, animais de 600 kg requerem 48 g).

O Consumo Diário é a quantidade de alimento que consomem os animais por dia (por exemplo, 5,0 kg).

$$\text{Quantidade de produto a ser acrescentado (kg)} = \frac{1000 \text{ kg} * 48 \text{ g}}{5 \text{ kg} * 1000}$$

Quantidade de produto a ser acrescentado (kg) = 9,6 kg

Importante:

- Recomenda-se começar o tratamento pelo menos 2 dias antes de iniciar o pastoreio em peões com forragens de risco espumante.
- O efeito carminativo do agente tensioativo se manifesta de imediato e o efeito máximo da monensina se expressará entre 7 e 10 dias depois de iniciado o tratamento.
- Com alta ocorrência de timpanismo, junto com a medicação, realizar um adequado controle.

Apresentação:

Sacos de 20 quilos.

BROUWER