

Antimicrobiano de amplo espectro para o tratamento de infecções produzidas por germes suscetíveis em bovinos, suínos, caninos, felinos, lhamas e alpacas. Solução estéril injetável.

Fórmula

Cada ml de comprimido contém:

Ceftiofur (como Cloridrato) 50 mg

Excipientes cps 1 ml

Indicações

Bovinos:

Doença respiratória dos bovinos (BRD); doença de transporte ou pneumonia bovina; necrobacilose interdigital aguda (podridão dos cascos).

Suínos:

Doença respiratória bacteriana.

Lhamas e alpacas:

Infecções respiratórias, metrites, infecções cutâneas, mastites. Pasteurelose e outras infecções causadas por agentes etiológicos sensíveis.

Agentes etiológicos suscetíveis:

Bovinos:

Pasteurella multocida; *Mannheimia haemolytica* (*Pasteurella haemolytica*); *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*); *Fusobacterium necrophorum*; *Bacteroides melaminogenicus*.

Suínos:

Actinobacillus pleuropneumoniae; *Pasteurella multocida*; *Salmonella choleraesuis*; *Streptococcus suis* tipo 2.

Lhamas e alpacas:

Actinomyces spp.; *Pasteurella* spp.

Dosagem e administração

Bovinos:

1 a 2 ml para cada 50 kg de peso (equivalente a 1 a 2 mg/kg). Via intramuscular nos músculos dos membros posteriores. Via subcutânea nos músculos do pescoço.

Suínos:

0,6 a 1 ml para cada 10 kg de peso (equivalente a 3 a 5 mg/kg). Via intramuscular nos músculos do pescoço.

Lhamas e alpacas:

1,1 ml para cada 25 kg de peso vivo. (equivale a 2, 2 mg/kg). Via intramuscular.

Duração do Tratamento

Bovinos e suínos:

Aplicar a cada 24 horas, durante três dias consecutivos. A duração do tratamento poderá prolongar-se durante dois dias adicionais, de acordo com o quadro clínico e critério do médico veterinário.

Lhamas e alpacas:

Aplicar a cada 12 horas durante três dias consecutivos. A duração do tratamento poderá prolongar-se por mais dois dias, de acordo com o quadro clínico e critério do médico veterinário.

Apresentação

Frasco-ampola contendo 100 ml.