

Cetfur[®] Plus

USO VETERINÁRIO

Antibiótico, anti-inflamatório, analgésico e antipirético para bovinos e suínos.
Solução estéril injetável.

Fórmula

Cada ml contém:

Ceftiofur (como cloridrato)..... 50 mg

Ketoprofeno..... 100 mg

Excipientes cps..... 1 ml

Indicações

Antibiótico de amplo espectro combinado com um anti-inflamatório, analgésico e antipirético não esteroide. Bactericida contra germes Gram positivos, Gram negativos e contra cepas bacterianas produtoras de beta-lactamases.

Agentes etiológicos sensíveis: *Salmonella choleraesuis*; *Actinobacillus pleuropneumoniae*; *Streptococcus suis* Tipo 2; *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica*; *Pasteurella multocida*; *Hystophilus somni (Haemophilus somnus)*; *Haemophilus parasuis*, *Fusobacterium necrophorum*; *Bacteroides melaninogenicus*; *Moraxella bovis*.

Bovinos:

Doença respiratória dos bovinos (BRD); doença de transporte ou pneumonia bovina; necrobacilose interdigital aguda (podridão dos cascos). Tratamento e prevenção de infecções do aparelho reprodutor (metrites).

Suínos:

Doença respiratória bacteriana. Tratamento e prevenção de infecções do aparelho reprodutor (metrites). A combinação de drogas permite tratar com eficácia processos infecciosos ou potencialmente infecciosos que se apresentam associados a dor e à inflamação. Entre tais processos, cabe mencionar: laminites aguda e crônica, mastite infecciosa aguda, distócia. Também é o produto escolhido para o período pós-cirúrgico imediato (cesáreas e outras cirurgias, como a descorna de bezerros mais velhos).

Dosagem e administração

Administrar a razão de 1 a 2 ml/50 kg, equivalente a 1 mg/kg a 2 mg/kg de ceftiofur e 2 mg/kg a 4 mg/kg de ketoprofeno.

Bovinos:

administrar exclusivamente por via intramuscular nos músculos dos membros posteriores.

Suínos:

administrar exclusivamente por via intramuscular nos músculos do pescoço.

Duração do tratamento

Aplicar a cada 24 horas, durante 3 dias consecutivos. A duração do tratamento poderá prolongar-se por mais dois dias, de acordo com o quadro clínico e critério do médico veterinário.

Apresentação

Frasco-ampola contendo 100 ml.

BROUWER