

Cisapride Brouwer

Procinético regulador da motilidade gastrointestinal para cães e gatos.
Comprimidos palatáveis para cães.

Fórmula:

Cada comprimido multidoso contém:

Cisapride.....20 mg
Excipientes cps.....300 mg

Indicações:

Evita o refluxo gastroesofágico.

Normaliza a motilidade gastrointestinal.

Favorece a eliminação de gases no síndrome de vólvulo/dilatação gástrica, dado que o aumento da motilidade estimula sua expulsão.

Resolve a flatulência de origem fermentativa, pois favorece a expulsão de gases por aumento da peristalse. Contribui à resolução do íleo paralítico primário ou secundário.

Favorece o trânsito gastrointestinal em processos obstrutivos parciais por corpos estranhos não perfurantes e brandos.

Indicado na constipação crônica e nos bolos fecais, especialmente naqueles gatos onde se suspeita transtornos da motilidade colônica.

Antiemético e antinauseoso naqueles casos nos quais os vômitos ou náuseas se produzem por transtornos do esvaziamento ou motilidade gastrointestinal. Não controla o vômito urêmico ou aquele provocado por cinetose.

Dosagem e administração:

A dose a ser administrada em cães e gatos é de 0,5 a 1 mg/kg. Esta dose corresponde a um comprimido a cada 20 a 40 kg.

A frequência de administração será a cada 8 a 12 h.

Em cães, esta dose poderá ser aumentada até 6 mg/kg a cada 8 h, de acordo com a patologia de base, resposta do animal e critério do médico veterinário. No íleo paralítico que se produz posterior a síndrome de torção dilatação gástrica recomenda-se de 6 mg/kg cada 8 h durante as primeiras 24-48 h. reduzindo esta dose à metade até 48 h depois de normalizados todos os sinais clínicos. Para o íleo paralítico consecutivo a obstruções por corpos brandos recomenda-se uma dose de 2 a 3 mg/kg a cada 8 a 12 h.

Em gatos não superar a dose de 2 mg/kg a cada 8 a 12 h. A duração do tratamento variará segundo o caso e critério do médico veterinário. Em casos agudos a duração do tratamento será de até 48 h depois de remitidos os sinais clínicos. Em casos crônicos o tratamento será prolongado com uma administração contínua por um período máximo de 12 meses podendo, nestes casos, realizar a dosagem c/12 horas.

Apresentação:

Estojo contendo 20 comprimidos multidoso.