

Cobrexilin[®] 10

Mineralizante para a prevenção e tratamento da hipocuprose em bovinos. Suspensão injetável estéril.

Fórmula:

Glicinato de Cobre 10 g
Excipientes cps 100 ml

Indicações:

Indicado para a prevenção e tratamento da deficiência de cobre, primária ou associada com a molibdenose em bovinos.

Dosagem e administração:

Administrar exclusivamente por via subcutânea, na parte baixa do pescoço, o mais perto possível da união com o tórax.

Devido a sua baixa viscosidade, podem ser utilizadas agulhas de 0,9 mm de diâmetro ou similares.

Agitar bem antes de usar, até a total ressuspensão do sedimento que se deposita no fundo do frasco. Calibrar com exatidão a seringa, de acordo com a dose a utilizar.

Cobrexilin 10 pode associar-se a outros tratamentos, como, por exemplo: desparasitações internas e externas, etc., mas em nenhum caso os produtos ou fármacos devem ser misturados na mesma seringa.

Animais com menos de 250 kg de peso: 2 ml por animal. Repetir a cada 3 meses.

Animais com mais de 250 kg de peso: 4 ml por animal. Repetir a cada 6 meses.

Vaquilhonas de 1º. serviço: 4 ml por animal,
1-2 meses antes do serviço.

Vacas vazias e touros: 4 ml por animal, 1-2 meses antes do serviço.

Vacas prenhes: 4 ml no último terço da prenhes.

Importante: Não aumentar as doses antes indicadas nem diminuir os intervalos indicados nas aplicações.

Apresentação:

Frasco-ampola contendo 250 ml.

BROUWER

The logo for Brouwer features the brand name in a bold, black, sans-serif font. Below the text is a stylized graphic consisting of a horizontal bar with a grey-to-white gradient on the left and a solid red section on the right, which tapers to a point on the far right.