

# Cobrexilin® Plus

USO VETERINARIO  
Venta bajo receta

## Fórmula

Cada 100 ml contiene

Cobre (Como Edetato disódico) .....	1,5 g
Zinc (Como Edetato disódico dihidrato) .....	5,0 g
Selenio (Como sal sódica) .....	0,5 g
Excipientes, c.s.p.....	100,0 ml

## Indicaciones

COBEXILIN PLUS está indicado para la prevención y el tratamiento de las deficiencias de Cobre, Zinc y Selenio. Su administración permite prevenir y corregir los trastornos asociados a las carencias de este grupo de microelementos como anemias, diarreas, fracturas, pérdida y decoloración del pelo, enfermedades musculares (músculo blanco), alteraciones de la piel y de las pezuñas, desórdenes en la reproducción y en el funcionamiento del sistema inmune y otras que reconocen como causa las carencias específicas de los minerales incluidos en la formulación.

## Forma de administración

Inyectable por vía subcutánea, en la parte baja del cuello, en lo posible cerca de la unión de éste con el tórax.

## Dosis

Tabla de dosificación

	PESO (kg)	DOSIS (mL)
Terminos	50 a 99	1
	100 a 150	2
	151 a 200	3
Novillos, Novillitos	201 a 400	4
Vaquillonas	201 a 400	4
Vacas	350 a 450	5
Toros	450 a 600	6

Importante: No superar las dosis indicadas.

El tratamiento es de una única dosis. En caso de que el médico veterinario considere necesaria la repetición del tratamiento, el intervalo entre la primera y segunda administración no debe ser inferior a los 30 días. Consulte a su médico veterinario para un diagnóstico correcto y una prescripción adecuada.

## Contraindicaciones

No utilizar simultáneamente otra sal de cobre o selenio por ninguna vía de administración. No utilizar en casos de hipercupremia.

## Advertencias

En bovinos con elevada reserva de Cobre, la administración de COBEXILIN PLUS, sin el diagnóstico previo, puede producir intoxicación.

En algunos animales puede presentarse una tumefacción en el punto de inyección que se resuelve sin tratamiento. Como para otros medicamentos inyectables, evite aplicar COBEXILIN PLUS antes o después de manejos que ocasionen stress severo. Utilice solo agujas y jeringas limpias y esterilizadas.

En animales hipersensibles y/o en casos de sobredosificación, puede presentarse reacción de hipersensibilidad con temblores, salivación espumosa, incoordinación, respiración acelerada, colapso. Ante eventuales reacciones alérgicas, aplicar adrenalina, corticoides o antihistamínicos de acción rápida.

Toxicidad en el hombre: No es probable un evento de toxicidad en el hombre. Ante la ingestión o inyección accidental o deliberada, consulte de inmediato a su médico. Tratamiento sintomático y de sostén.

**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**

## Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños y personas inexpertas.

Es recomendable realizar una determinación de los niveles de cobre antes de indicar la administración de COBEXILIN PLUS sobre todo en aquellos animales menores a los 5 meses de edad.

Plazo de restricción para envío a faena: No posee  
Plazo de restricción para leche para consumo: No posee.

### **Conservación**

Mantener en su envase original, a temperatura ambiente entre 5° y 30 °C. No refrigerar.

Brouwer SA, empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua.

### **■ SENASA**

Certificado N° 16-036

Est. Elab. N° 4639. Industria Argentina

### **BROUWER S.A.**

Dir. Técn.: Rodolfo A.M. Perotti.

Médico Veterinario M.P. N° 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD)

Buenos Aires, Argentina.

Tel.: (54 11) 4555-6663.

[www.brouwer.com.ar](http://www.brouwer.com.ar)