

Coltec[®] 200 Premix

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

Fórmula

Cada 100 g de producto contiene:

Clortetraciclina HCl 20 g*

Excipientes c.s.p..... 100 g

*equivale a 18.6 g de clortetraciclina base

Descripción

Coltec 200 Premix es una premezcla antimicrobiana a base de clortetraciclina para ser administrada en el alimento de los cerdos y las aves (reproductores, pollitas de reposición y pollos parrilleros). Para el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias sensibles a la clortetraciclina, para tratamiento y profilaxis de infecciones respiratorias y gastrointestinales.

Indicaciones

Es altamente activo frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas, tanto aerobios como anaerobios, así como microorganismos susceptibles entre los que se encuentran: Mycoplasmas, Rickettsias y Chlamydias, así como algunos protozoos y hongos patógenos.

Porcinos

Control y tratamiento de diarreas y abortos por leptospirosis, infecciones entéricas y de las vías respiratorias como rinitis atrófica, neumonía enzoótica, neumonía por *Haemophilus*, enteritis necrótica, enteritis no específica, disentería, diarrea post destete, adenomatosis intestinal porcina, infecciones asociadas con *Escherichia coli* y con *Salmonella colera suis*, estreptococosis, pleuroneumonías, Enfermedad de Glasser, problemas reproductivos asociados a Leptospirosis, problemas articulares ocasionados por Estreptococos y Estafilococos y otras afecciones causadas por gérmenes sensibles a la clortetraciclina.

Aves

Control y tratamiento de sinovitis infecciosa por *Mycoplasma synoviae*, mortandad asociada a *E. coli*, infecciones secundarias a virus, enfermedades por coccidios o micoplasmas, estrés o mortandad temprana por causas inespecíficas (colisepticemia, septicemia del pato, onfalitis, cólera aviar, coriza infecciosa, enfermedad respiratoria crónica causada por *Mycoplasma gallisepticum*, o *Mycoplasma synoviae* y complicada con *Escherichia coli*, problemas digestivos causados por *Salmonella enteritidis*, *Salmonella typhimurium* o *Moraxella anatipestifer* y otras afecciones causadas por gérmenes sensibles a la clortetraciclina.

Vías de administración

Vía oral, mezclado con el alimento.

Dosis

Porcinos: Debe administrarse a razón de 2 kg por tonelada de alimento (equivalente a 400 ppm) durante 7- 14 días. El tratamiento se debe mantener hasta que los signos de la enfermedad ya no sean aparentes.

Aves: La dosis recomendada en aves es de 300-400 ppm o bien 20- 60 mg/kg peso / día, o sea de 1.5 kg a 2 kg por tonelada de alimento. Se recomienda un período de tratamiento de 7 días, el tratamiento se debe mantener hasta que los signos clínicos no sean aparentes.

Sugerencia: Se recomienda preparar una premezcla de la cantidad total de Coltec 200 Premix que se va a administrar, en unos 10 a 20 kg de alimento y luego incluir esta premezcla en la cantidad total de alimento.

Contraindicaciones

No administrar en casos de hipersensibilidad a las tetraciclinas. En caso de disfunción renal o hepática, debe ajustarse la dosis.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de animales, niños y personas inexpertas. Al manipular el producto utilizar ropa adecuada, gafas protectoras y guantes. Evitar el contacto con la piel o las mucosas.

Centro nacional de intoxicaciones: 0800 333 0160.

Para el transporte mantenga en su envase original. No almacenar junto con bebidas, agua, o alimentos. Evite

dañar el envase. No pinchar, agujerear o cortar el envase. Los envases vacíos pueden ser incinerados o enterrados. No arrojar a cursos de agua.

Consumir el alimento medicado antes de los 15 días de preparado.

Restricciones de uso

Periodo de retiro: 7 días en aves y porcinos.

No usar en aves productoras de huevos destinados a consumo humano.

No utilizar en vacas u ovejas productoras de leche para consumo humano.

No usar conjuntamente con penicilinas.

Conservar en su envase original entre 5° y 30°C.

■ senasa

Cert. N° 15-123

Estab. Elab. N°: 4384 - Industria Argentina

Dir. Técn.: M.V. Rodolfo Perotti M.P. N° 2705

Brouwer S.A.

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD)

Buenos Aires, Argentina

Tel/fax: 4555 6663.

www.brouwer.com.ar