

Crema Dérmica. Antibacteriana, Antimicótica, Antiinflamatoria, Antipruriginosa, Antialérgica, Anestésica, Cicatrizante, Epitelizante.  
Caninos y Felinos.

## Fórmula

Cada 100 g contiene:

Gentamicina Base (como sulfato) .....	0,12 g
Clotrimazol .....	1,00 g
Betametasona-17-valerato .....	0,12 g
Lidocaína base (como clorhidrato) .....	0,50 g
Vitamina A Palmitato .....	0,06 g*
Agentes de formulación, c.s.p. ....	100,00 g

\* Equivalente a 100.000 UI de Vitamina A

## Indicaciones

Para el tratamiento de lesiones dermatológicas de etiología diversa, incluyendo infecciones bacterianas y micóticas, traumáticas y de origen alérgico. Aplicado sobre la piel presenta:

- Fuerte actividad antimicrobiana, cubriendo el espectro bacteriano y micótico común en dermatología de caninos y felinos.
- Acción antiinflamatoria local, permitiendo resolver los procesos en los cuales la inflamación juega un rol de importancia
- Acción anestésica local, por lo cual calma de inmediato el prurito y el dolor característicos de estas patologías
- Efecto protector cutáneo y estimulante de la regeneración de la epidermis y la cicatrización, otorgado por la vitamina A.

## Espectro de acción

La gentamicina permite combatir con eficacia a los agentes bacterianos susceptibles, comúnmente asociados a dermatitis de origen infeccioso o contaminadas por flora bacteriana como: *Proteus spp.*, *Staphylococcus spp.* y *Escherichia coli*. Las cepas de *Pseudomona spp.* y *Streptococcus*  $\beta$  hemolíticos son susceptibles entre un 75 y el 90 %.

La presencia de clotrimazol lo hace efectivo para el tratamiento de infecciones micóticas y por levaduras como: *Microsporium spp.*, *Candida albicans*, *Trichophyton spp.* y *Malassezia spp.*

Vía de administración: Tópica

## Dosis y Modo de uso

Aplicar una capa delgada sobre el área de piel a tratar dos a cuatro veces por día dependiendo de la etiología de las patologías a tratar.

## Recomendaciones de uso y duración del tratamiento

Para dermatitis infecciosas: Tratar por 7 a 14 días.

Para dermatitis micóticas: el tratamiento puede extenderse hasta 30 días.

En el caso de lesiones inflamatorias, por su curso variable, el tratamiento debe extenderse hasta la desaparición de los síntomas. En general bastan 5 a 7 días de tratamiento.

Siempre es conveniente extender el tratamiento por unos días luego de la remisión de las lesiones, particularmente en el caso de dermatitis micóticas.

## Contraindicaciones y limitaciones de uso

No posee

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas inexpertas. En caso de ingestión accidental o intencional comuníquese con el médico.

**Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel. 0800-333-0160**

Conservar a temperatura ambiente, entre 15° y 30° C.

Mantener el producto en su envase original, cerrado y al abrigo de la luz solar directa.



Certificado N° 14-097

Est. Elab. N° 4384 Industria Argentina

Dir. Técn.: M.V. Rodolfo A.M. Perotti M.P. N° 2705

**BROUWER S.A.**

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires.

Tel.: (54 11) 4555-6663.

[www.brouwer.com.ar](http://www.brouwer.com.ar)