

Atención: Lea el rótulo. Venta bajo receta

Fórmula

Cipermetrina 2,2-dimetil-3-(2,2 diclorovinil)-ciclopropil carboxilato de alfa-ciano-3-fenoxibencilo 5 g
Agentes de formulación c.s.p. 100 mL

Indicaciones de uso

Control de la Mosca del cuerno (*Haematobia irritans*). Su acción insecticida es casi inmediata eliminando a las moscas a los pocos minutos de ser aplicado. Su poder residual las mantiene alejadas de los animales por 45 días o más. Tratamiento y control de piojos chupadores y masticadores en bovinos, equinos, ovinos y porcinos. Acaricida (*Otobius megnini*) en bovinos. Puede aplicarse en animales de cualquier edad y sexo, aún en hembras preñadas. Su administración puede realizarse en cualquier época del año y por su particular formulación, no es afectado por las lluvias, salvo las de mucha intensidad. No mancha ni afecta a la lana.

Modo de uso

Derramin pour on se aplica tal cual, directamente sobre la piel del animal, con el envase dosificador o utilizando cualquier tipo de pistola dosificadora, limpia. En ovinos con lana entera introducir la boquilla de la pistola dosificadora a través del vellón, hasta hacer contacto con la piel. En porcinos que tengan el cuerpo cubierto con barro seco, es conveniente desprenderlo para que el producto haga contacto directo con la piel.

Dosis

MOSCA DEL CUERNO (*Haematobia irritans*)

Bovinos de hasta 400 kilos: 10 mL distribuidos desde la nuca hasta la cola.

Bovinos de más de 400 kilos: 20 mL distribuidos desde la nuca hasta la cola.

ACARICIDA (*Otobius megnini*)

Bovinos: 1 mL en cada oreja, en el conducto auditivo externo.

PIOJOS MASTICADORES Y CHUPADORES

Bovinos y equinos: animales de hasta 400 kilos: 10 mL, en la cruz. Animales de más de 400 kilos: 20 mL, en la cruz.

Ovinos: 5 mL, entre las escápulas.

Porcinos: 5 mL, en la cruz.

Con Derramin pour on la máxima efectividad contra los piojos se alcanza entre la cuarta y la sexta semana desde su aplicación.

Repetición del tratamiento:

Mosca del cuerno: Aproximadamente cada 45 días o más, de acuerdo con la intensidad de la parasitación, ésta varía de acuerdo a la época del año, lluvias, temperaturas, vientos. Piojicida: No es necesario repetir el tratamiento, salvo reinfestaciones. Protege por 3 a 4 meses. En ovinos puede aplicarse en cualquier época del año, sin importar el largo de la lana. Acaricida: No es necesario repetir el tratamiento salvo reinfestaciones.

Precauciones generales

Mantener en su envase original. Peligrosa su ingestión, aspiración y contacto con la piel. Guardar bajo llave, mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Evitar la contaminación de los alimentos. No almacenar o transportar junto con los alimentos. Destruir los envases que lo hayan contenido. Producto tóxico sobre abejas y peces. No contaminar estanques o cursos de agua.

Precauciones durante el uso

Usese con cuidado. Cambiarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón al finalizar las tareas. Si cae producto sobre la piel o mucosas, lavarse con abundante agua y jabón y cambiarse inmediatamente. No fumar, beber o comer durante el trabajo. Guardar el resto de Derramin pour on en su envase original, bien cerrado.

Primeros auxilios

Si hubo ingestión: proporcionar atención médica inmediatamente. No provocar vómito, no dar de beber leche, sustancias grasas o aceites. Si hubo contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos. Si hay irritación, acudir al médico. Si hubo contacto con la piel: quitar la ropa y lavar con agua y jabón todas las partes afectadas. Dar atención médica si la piel está irritada.

Advertencia para el médico

VENENO: producto levemente tóxico (clase III) (OMS). Producto piretroide sintético. Síntomas: Dolor de cabeza, estornudos, anestesia de labios y lengua. Irritabilidad e incoordinación de movimientos, convulsiones. Tratamiento médico: Humanos: No hay antídoto específico, realizar tratamiento sintomático.

Consultas en casos de intoxicaciones

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Buenos Aires: Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115. La Plata: Hospital de Niños Sor María Ludovica: (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital de Urgencias: (0351) 427-6200. Santa Fe: Hospital Dr. José María Cullen: (0342) 457-3357 int. 268. Salta: Hospital Materno Infantil: (0387) 422-0519. Neuquén: Hospital Regional: (0299) 449-0800.

Restricciones de uso

Ganado de carne: entre el último tratamiento y el consumo humano deberán transcurrir 6 días.

Ganado de leche: entre el último tratamiento y el consumo humano o industrial deberán transcurrir 6 horas.

Temperatura de conservación

Entre 5 y 35° C.

Brouwer S.A. empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua.

SENASA

Certificado N°: 88.234

Est. Elab. N° 4384

Industria Argentina

BROUWER S.A.

Dir. Técn.: Dr. Rodolfo A. M. Perotti.

Médico Veterinario M.P. N°: 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires

Tel.: (54 11) 4555-6663.

www.brouwer.com.ar