

Diazepet®

Tranquilizante e anticonvulsivante para cães e gatos.
Solução estéril injetável.

Fórmula:

Diazepam..... 500 mg
Excipientes cps 100 ml

Indicações:

Diazepet é indicado como sedativo para o tratamento das convulsões, controle da hiperexcitabilidade ou como relaxante muscular. É frequentemente utilizado em combinação com outras drogas na pré-medicação e indução anestésica, o que facilita o manuseio do animal durante a anestesia e permite melhor recuperação.

Em alguns animais, principalmente gatos, o diazepam é utilizado em pequenas doses, como orexígeno e no tratamento de problemas comportamentais, tais como pulverização de urina ou agressividade.

Dosagem e administração:

Via de administração: por via injetável endovenosa, intramuscular e intrarretal.

Ao contrário do que ocorre com outras formulações, o Diazepet pode ser combinado em uma mesma seringa com outras drogas em solução aquosa, como a ketamina.

Convulsões: Cães e gatos: em geral, a dose recomendada de diazepam em ambas as espécies é de 0,2 ml/kg, administrada por via endovenosa. Para a administração em dose única, o limite superior sugerido é o seguinte:

- Cães: 4 ml (20 mg)
- Gatos: 1 ml (5 mg)

Diazepet pode ser administrado em cães que sofrem de convulsões como uma solução líquida por via retal a uma dose de 1 mg/kg. Sugerimos esta via em virtude das outras formas de administração apresentarem dificuldades durante as convulsões.

As doses são indicativas, principalmente, no caso de tratamento de crises epiléticas em que não é possível estabelecer uma dose fixa, sendo necessário aplicar segundo o efeito.

No tratamento do status epilético, recomenda-se uma dose de 0,5 a 1 mg/kg (0,1 a 0,2 ml de Diazepet por kg de peso corporal) em aplicação lenta, por meio de um bolo endovenoso.

Pré-medicação anestésica: em cães, o diazepam é utilizado para a indução anestésica em uma dose de 0,27 - 0,44 mg/kg (0,05 a 0,08 ml de Diazepet por kg de peso corporal) por via endovenosa, seguido por ketamina 11 mg/kg por via endovenosa. A duração da anestesia é de 5 a 22 minutos; a recuperação se caracteriza por 10 a 15 minutos de ataxia e incoordenação. Esta dose é considerada uma pré-medicação efetiva e segura, particularmente em cães de idade avançada com doença cardíaca, podendo ser aumentada para 0,6 mg/kg.

Transtornos de conduta e desordem alimentar em gatos: o diazepam pode ser administrado em dose de 0,05 - 0,4 mg/kg por via EV ou IM como orexígeno em felinos debilitados e anoréxicos e para o tratamento de problemas de comportamento, tais como pulverização de urina ou agressividade.

Intervalo entre as doses:

Não é possível estabelecer um intervalo de dose, já que no caso da pré-medicação, uma única dose é usada e para o tratamento das crises epiléticas é geralmente administrada como uma medida de emergência e, em seguida, o tratamento deve continuar com anticonvulsivantes orais. Para animais em estado epilético, a seguinte dosagem é sugerida:

- Cães: 0,2 ml/kg administrados de acordo com a necessidade ou a cada 6 horas.
- Gatos: 1 a 4 mg totais a cada 12 a 24 horas.

Duração do tratamento:

A duração do tratamento depende da condição do animal tratado, da resposta ao tratamento e da manifestação de efeitos adversos.

Apresentação:

Frasco-ampola contendo 10 ml.

BROUWER