

Comprimidos palatables.

Fórmula

Etodolac 150.0 mg
Excipientes csp. 2000 mg

DOLOALIVIO es un potente anti-inflamatorio no esteroide (AINE) que además posee acción analgésica y antipirética, de uso en caninos exclusivamente. Su característica diferencial es la actividad bloqueante o inhibitoria selectiva sobre la enzima ciclo-oxigenasa 2 (cox-2), sin afectar a la ciclo-oxigenasa 1 (cox-1).

Indicaciones

Anti-inflamatorio no esteroide, analgésico y antipirético. Indicado para el tratamiento del dolor y la inflamación asociada con osteoartritis, osteoartrosis secundaria por displasia de cadera y artritis reumatoidea de los caninos.

Dosis y modo de uso

Un (1) comprimido cada 10 a 15 Kg de peso, administrado cada 24 horas, vía oral. La dosis debe ser ajustada hasta obtener una respuesta clínica satisfactoria, pero nunca superar la máxima de 15 mg/Kg por día. La duración del tratamiento será de ocho días. Puede administrarse con las comidas o alejadas de ellas. En el caso de administrarse con el alimento, la dosificación total se mezclará en una pequeña cantidad del mismo, para asegurarse su consumo total.

Contraindicaciones

No utilizar en felinos. No utilizar en caninos con hipersensibilidad al etodolac. No se recomienda su uso en hembras preñadas o en lactación. Está contraindicado su uso con otros AINE o corticoides. No utilizar en caninos con antecedentes de úlcera gástrica. No utilizar en pacientes que presenten síntomas de deshidratación.

Precauciones

No es conveniente tratar animales menores de un año de edad. Utilizar con precaución en animales con un peso menor a 2,5 Kg, debido a posibles dificultades en la dosificación.

Caninos tratados con anti-inflamatorios no esteroideos como DOLOALIVIO, requieren de la supervisión del Médico Veterinario para evaluar si la dosificación es la adecuada y es bien tolerada por el canino ante cuadros de deshidratación, administración de diuréticos o la presencia de enfermedades pre-existentes en estómago, intestinos, riñón, corazón o hígado. Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas inexpertas.

Efectos colaterales

En algunos animales pueden presentarse casos de: emesis, somnolencia, diarreas (que pueden ser sanguinolentas) e hipoproteinemia. Frente a estos casos se deberá suspender el tratamiento.

Toxicidad

Caninos. Frente a casos de ingestión de una sobredosis aguda, pueden presentarse los siguientes síntomas: inapetencia, somnolencia, náuseas, vómitos, dolor epigástrico, anormalidades en la materia fecal e hipoproteinemia. Se deberá suspender el tratamiento y tratar sintomáticamente. DOLOALIVIO no posee antídoto.

Humanos. Ante casos de ingestión accidental, provocar el vómito y llamar al Médico. Los síntomas de intoxicación son similares a los de los caninos. Se sugiere lavado gástrico, la administración de carbón activado y tratamiento sintomático por no poseer antídoto. En casos de intoxicación accidental o deliberada en el hombre, concurrir a un centro hospitalario.

Una vez utilizado el producto, el envase vacío se envolverá en varias hojas de papel, para finalmente ser colocado en el recipiente para residuos.

Presentación

Envases de polietileno conteniendo 15 comprimidos palatables birranurados.

Conservación

Mantener en su envase original, al abrigo de la luz solar directa, entre 5° y 35° C.



Certificado N° 01-071

Est. Elab. N° 4384

Industria Argentina

Elaborado por BROUWER S.A.

Dir. Técn.: Dr. Rodolfo A. M. Perotti

Médico Veterinario M. P. N° 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires. Argentina.

Tel.: (54 11) 4555-6663 - www.brouwer.com.ar