

# Enroxina® 150

USO VETERINARIO  
Venta bajo receta médico veterinaria

Comprimidos orales. Quimioterápico para caninos y felinos.

ENROXINA 150 es un quimioterápico de amplio espectro para caninos. Es activo contra gérmenes Gram positivos y Gram negativos.

Su uso ofrece la ventaja de una fácil dosificación, amplio margen de seguridad y acción efectiva donde otros agentes fallan.

## Fórmula

Enrofloxacino ..... 150 mg  
Excipientes c.s.p ..... 400 mg

## Indicaciones

Se indica para el tratamiento de las infecciones del aparato respiratorio, digestivo, reproductor, urinario y piel. El Enrofloxacino es activo contra *E.coli* - *Salmonella sp.* - *Proteus sp.* - *Klebsiella sp.* - *Pasteurella sp.* - *Bordetella sp.* - *Pseudomona sp.* - *Brucella canis* - *Staphylococcus sp.* - *Corynebacterium sp.* - *Streptococcus sp.* y *Mycoplasma sp.*

## Dosis y Modo de uso

La dosis diaria a suministrar en caninos es de 5 mg/kg correspondiente a 1 comprimido cada 30 kg. El comprimido multidosis permite una fácil dosificación para animales de menor peso. Esta dosis debe repetirse cada 24 horas. Puede administrarse cada 12 horas de acuerdo a la patología y criterio médico veterinario. La duración del tratamiento deberá ser de 5 a 10 días dependiendo del órgano afectado, la gravedad del caso y criterio del Médico Veterinario. En afecciones dermatológicas puede requerirse un uso más prolongado, superior a los 20 días.

## Recomendaciones

No administrar a cachorros menores de 6 meses de edad, dado que pueden producirse daños en el cartílago de crecimiento. No administrar en animales con síndrome convulsivante en tratamiento con Fenobarbital. No administrar conjuntamente con Teofilina. No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a las quinolonas y al ácido nalidíxico. Utilizar con precaución en animales con función renal alterada.

## Advertencia

En muy raras ocasiones, la enrofloxacina se relacionó con toxicidad de retina en gatos. No superar la dosis indicada de 5 mg / Kg de peso por día. Administrar con cuidado en animales con insuficiencia renal o hepática. Si se sobredosifica accidentalmente, evite la exposición a la luz solar directa.

## Conservación

Mantener en lugar seco, en su envase original entre 4° y 30° C.

## Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños.

**Centro Nacional de Intoxicaciones (Argentina): 0800-333-0160.**

## Presentación

Envase con 10 comprimidos.

## ■ SENASA

Certificado N° 00-117

Establecimiento Elaborador N° 4384.

Industria Argentina

## Elaborado por BROUWER S.A.

Director Técnico: Dr. Rodolfo Perotti. Médico Veterinario. M.P: 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 -(C1427AZD) Buenos Aires, Argentina.

Tel.: (54 11) 4555-6663. [www.brouwer.com.ar](http://www.brouwer.com.ar)

**BROUWER**