

# Fenobarbital<sup>®</sup> PG

Anticonvulsivante para cães e gatos.

Fórmula:

Cada comprimido multidoso contém:

Fenobarbital ..... 40 mg

Excipientes cps ..... 300 mg

## Indicações:

Para tratamento da epilepsia primária ou idiopática, epilepsia secundária, convulsões focalizadas ou generalizadas.

**Para transtornos do comportamento:** hiperexcitabilidade, agressão afetiva, lambido excessivo, atitude de caçar moscas inexistentes, automutilação, animais que correm em círculos tentando morder o rabo, hipersexualidade, comportamento destrutivo.

Como tranquilizante nos animais nervosos o irritáveis que requerem sujeição química e não devem receber promacínicos, pois são totalmente contraindicados em animais que apresentam convulsões.

Em animais com intenso prurido diminui a sensação de comichão e ajuda a controlar a coceira e automutilação excessiva que produz dano mecânico da pele.

## Dosagem e administração:

**Gatos:** 1-4 mg/kg a cada 12 horas (1/4-1/2 comprimido multidoso para um gato adulto a cada 12 horas).

**Cães:** Epilepsia: 2 mg/kg a cada 12 horas (1/2 comprimido cada 10 kg cada 12 horas). As margens mínimas e máximas descritas são 1-15 mg/kg a cada 12 horas.

**Transtornos do comportamento:** 1-4 mg/kg a cada 12 horas. É necessário um período de 8-15 dias para atingir níveis terapêuticos estáveis em sangue. O fenobarbital pode combinar-se com outras drogas antiepiléticas.

Após tratamento de 6 meses nos quais haja convulsões, a dose poderá ser diminuída. Isto deverá ser feito de modo progressivo e lento, para evitar o aparecimento do status epiléptico.

O fenobarbital deve ser administrado longe das refeições. A dose aqui sugerida é orientadora e a que gera respostas na maioria dos casos. Contudo há uma grande variação na resposta individual. Poderão ser administradas doses superiores às sugeridas, a critério do médico veterinário devendo monitorar-se o aparecimento de efeitos colaterais indesejáveis. Após um período de tratamento pode ser necessário elevar a dose ou a frequência pelo efeito da indução enzimática.

## Apresentação:

Estojo contendo 30 comprimidos multidoso.