

# Maxillia<sup>®</sup>500 Polvo Soluble

USO VETERINARIO  
Venta bajo receta

## Fórmula

Cada 100 g de producto contiene:

Amoxicilina (como trihidrato) ..... 50 g\*

Excipientes c.s.p. ....100 g

\*Equivalente a 57,4 g de amoxicilina trihidrato.

## Indicaciones

Antibiótico de amplio espectro. Indicado para combatir afecciones producidas por agentes infecciosos sensibles a la amoxicilina en el aparato respiratorio, genitourinario, digestivo, tejidos blandos y complicaciones bacterianas de afecciones víricas. Indicado para tratar: Actinobacilosis, Cistitis, Dermatitis, Necrosis de cola, Nefritis, Onfalitis, Síndrome MMA, Sinovitis por *Staphylococcus spp*, *Hæmophilus parasuis*, *Pasteurella multocida*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus suis*, Artritis, Colibacilosis, Coriza Infecciosa, Enteritis Infecciosa, Enfermedades Clostridiales, Pasteurellosis, Salmonelosis y otras enfermedades producidas por microorganismos sensibles a la amoxicilina.

## Administración y Dosis

Administrar por vía oral, mezclado en el agua de bebida, a razón de 40 mg diarios de Maxillia por kilogramo de peso vivo, equivalentes a 20 mg de amoxicilina. La duración del tratamiento es de 3 a 7 días, según criterio del Médico Veterinario.

La dosis se obtiene preparando el agua de bebida de acuerdo a las siguientes recomendaciones, pudiéndose variar de acuerdo a la categoría de animal y a la evolución de la enfermedad bajo tratamiento y al consumo medio de agua.

**Aves y cerdos:** 400 grs. de Maxillia 500 Polvo Soluble en el agua, cada 10.000 kg. de peso vivo, diariamente durante 3 a 7 días.

- Para aves 0.266 g de Maxillia por litro de agua por día.
- Para porcinos: 0.70 g de Maxillia por litro de agua por día.

**Sugerencia:** Se recomienda preparar la premezcla con la cantidad total de Maxillia que se va a administrar en solo 10 litros de agua. Una vez diluida esa premezcla, agregar la cantidad total de agua a administrar durante el tratamiento.

Preparar el agua medicada que se va a consumir en las siguientes 6 a 8 horas. No guardar sobrantes para su uso posterior.

## Contraindicaciones

No administrar a animales alérgicos a la amoxicilina. Discontinuar el tratamiento si aparecen trastornos en la piel. No administrar conjuntamente con tetraciclinas. No administrar a lagomorfos (conejos, hamsters, ardillas).

## Restricciones De Uso

No usar en gallinas de postura cuyos huevos se destinen a consumo humano.

**Aves:** deben transcurrir 5 días entre el final del tratamiento y el sacrificio del animal con destino al consumo humano.

**Cerdos:** deben transcurrir 15 días entre el final del tratamiento y el sacrificio del animal con destino al consumo humano.

## Precauciones

Evitar la luz solar directa sobre el producto.

En caso de contacto directo con el producto lavar con abundante agua las zonas expuestas (piel, mucosas, ojos, etc.) Las personas alérgicas al grupo de antibióticos betalactámicos (penicilinas) no deben entrar en contacto directo con el producto.

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, mantener hidratado y contactar con urgencia al médico. **Centro Nacional de Intoxicaciones : 0800 333 0160.**

Conservar en su envase original entre 15° y 30°C.

## ■ SENASA

Cert. N° 15-093

Estab. Elab. N°: 5648 Industria Argentina

Dir. Técn.: M.V. Rodolfo Perotti M.P. N° 2705

**Brouwer S.A.**

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Tel/fax: 4555 6663.

[www.brouwer.com.ar](http://www.brouwer.com.ar)