

Maxillia[®]500 Premix

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

Fórmula

Cada 100 g de producto contiene:

Amoxicilina (como trihidrato) 50 g*

Excipientes c.s.p.100 g

*Equivalente a 57,4 g de amoxicilina trihidrato.

Indicaciones

Antibiótico de amplio espectro. Indicado para combatir afecciones producidas por agentes infecciosos sensibles a la amoxicilina en el aparato respiratorio, genitourinario, digestivo, tejidos blandos y complicaciones bacterianas de afecciones víricas. Indicado para tratar: Actinobacilosis, Cistitis, Dermatitis, Necrosis de cola, Nefritis, Onfalitis, Síndrome MMA, Sinovitis por *Staphylococcus spp*, *Hæmophilus parasuis*, *Pasteurella multocida*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus suis*, Artritis, Colibacilosis, Coriza Infecciosa, Enteritis Infecciosa, Enfermedades Clostridiales, Pasteurellosis, Salmonelosis y otras enfermedades producidas por microorganismos sensibles a la amoxicilina.

Administración y Dosis

Administrar por vía oral, mezclado en el alimento, a razón de 40 mg diarios de Maxillia por kilogramo de peso vivo, equivalentes a 20 mg de amoxicilina. La duración del tratamiento es de 3 a 7 días, según criterio del Médico Veterinario.

La dosis se obtiene preparando el alimento de acuerdo a las siguientes recomendaciones, pudiéndose variar de acuerdo a la categoría de animal y a la evolución de la enfermedad bajo tratamiento.

Lechones: 400 a 600 g. por tonelada de alimento (equivalente a 200-300 g de amoxicilina) durante 5 a 7 días.

Cerdos: 600 a 800 g. por tonelada de alimento (equivalente a 300-400 g de amoxicilina) durante 5 a 7 días.

Aves: 400 a 800 g. por tonelada de alimento (equivalente a 200-400 g de amoxicilina) durante 3 a 5 días.

Sugerencia: Se recomienda preparar la premezcla con la cantidad total de Maxillia 500 Premix que se va a administrar en unos 10 kg de alimento y luego incluir esta premezcla en la cantidad total de alimento.

En caso de que la afección deprima marcadamente el consumo de alimento, se recomienda comenzar el tratamiento con Maxillia 500 Polvo Soluble en el agua de bebida pasando a las 48 -72 horas a la medicación en el alimento.

Contraindicaciones

No administrar a animales alérgicos a la amoxicilina.

Discontinuar el tratamiento si aparecen trastornos en la piel.

No administrar conjuntamente con tetraciclinas.

No administrar a lagomorfos (conejos, hamsters, ardillas).

Restricciones De Uso

No usar en gallinas de postura cuyos huevos se destinen a consumo humano.

Aves: deben transcurrir 5 días entre el final del tratamiento y el sacrificio del animal con destino al consumo humano.

Cerdos: deben transcurrir 15 días entre el final del tratamiento y el sacrificio del animal con destino al consumo humano.

Precauciones

Evitar la luz solar directa sobre el producto.

Si el alimento será granulado o pelletizado, no superar los 65 - 70 °C durante más de 2 minutos.

En caso de contacto directo con el producto lavarse con abundante agua la piel, mucosas u ojos expuestos. Las personas alérgicas al grupo de antibióticos betalactámicos (penicilinas) no deben entrar en contacto directo con el producto.

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión de una cantidad importante, mantener hidratación y contactar con urgencia al médico.

Centro Nacional de Intoxicaciones : 0800 333 0160.

Conservar en su envase original entre 5° y 30°C.

 **SENASA**

Cert. N° 15-094

Estab. Elab. N°: 5648 Industria Argentina

Dir. Técn.: M.V. Rodolfo Perotti M.P. N° 2705

Brouwer S.A.

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Tel/fax: 4555 6663.

www.brouwer.com.ar