

Meltra® 4% Premix

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

Fórmula

Fenbendazol	4,00 g
Excipientes c.s.p.	100,00 g

Indicaciones

Antiparasitario interno para porcinos, efectivo contra adultos, larvas y huevos de nematodos. Indicado para la prevención y tratamiento de infestaciones producidas por los siguientes parásitos: Gastrointestinales: *Hyostrongylus rubidus* (estómago), *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi* (intestino delgado), *Oesophagostomum spp*, *Trichuris suis* (intestino grueso). Pulmonares: *Metastrongylus spp*. Renales: *Stephanurus dentatus*.

Dosis y vía de administración

En cerdos de engorde: Administrar a razón de 3 g de Meltra 4% Premix por cada 25 kg de peso vivo, equivalente a 5 mg de fenbendazol por kg de peso. Tomando como base un consumo diario de 10 kg de alimento por animal de 200 kg.p.v., incorporar:

Duración del tratamiento	Dosis Meltra 4% Premix / Tn de alimento terminado	Equivalencia en fenbendazol
1 día	2.5 kg	100 ppm
5 días	500 g	20 ppm
10 días	250 g	10 ppm
Continuo	150 g (desde el destete y durante todo el engorde)	6 ppm

Importante: En infestaciones por *Stephanurus dentatus* aumentar la dosificación al doble (10 mg/kg p.v. durante un día). Para el tratamiento de *Cysticercus cellulosae*, se recomienda el tratamiento con 5 mg/kg p.v. durante 7 días.

Advertencias de uso

Debe asegurarse un correcto mezclado cuando se incorpora el producto en el alimento. Consumir el alimento medicado dentro de los 15 días de preparado.

En cerdas: Tomando como base un consumo diario de 2.5 kg de alimento por animal de 200 kg.p.v., incorporar:

Duración del tratamiento	Dosis Meltra 4% Premix / Tn de alimento terminado	Equivalencia en fenbendazol
1 día	10 kg	400 ppm
5 días	1 kg	80 ppm
15 días	670 g	27 ppm

Contraindicaciones

A las dosis recomendadas no presenta incompatibilidades ni antagonismos con la administración de otros productos veterinarios. No presenta contraindicaciones ni limitaciones de uso.

Efectos Colaterales

Pueden ocasionarse infrecuentes episodios de hipersensibilidad.

Restricciones De Uso

No destinar animales a consumo humano hasta pasados 8 días del tratamiento.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños, animales y personas inexpertas. No presenta riesgos para la salud humana. En caso de ingestión accidental, consulte al médico y, de ser posible, lleve este rótulo.

Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.

Conservar entre 15° y 30° C

■ SENASA

Cert. N° 15-095

Estab. Elab. N°: 5648 Industria Argentina

Dir. Técn.: M.V. Rodolfo Perotti M.P. N° 2705

Brouwer S.A.

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Tel/fax: 4555 6663. www.brouwer.com.ar

BROUWER