

# Meltra® Endectocida 3.15%

Antiparasitário externo e interno para bovinos e ovinos. Solução estéril injetável.

## Fórmula

Ivermectina ..... 3,15 g  
Agentes de formulação cps ..... 100,00 ml

## Indicações

Ação Antiparasitária em bovinos

Parasitas Gastrointestinais

*Ostertagia ostertagi*: adultos, L3, L4 (incluindo estados inibidos de *Ostertagia spp*), *Ostertagia lyrata*: adultos e L4, *Haemonchus placei*: adultos L3 e L4, *Trichostrongylus axei*: adultos e L4, *T. colubriformis*: adultos e L4, *Cooperia oncophora*: adultos e L4, *C. pectinata*: adultos e L4, *C. punctata*: adultos e L4, *Capillaria bovis*: adultos e L4, *Oesophagostomum radiatum*: adultos, L3 e L4, *Nematodirus helvetianus*: adultos  
*N. spathiger*: adultos, *Strongyloides papillosus*: adultos, *Bunostomum phlebotomum*: adultos, L3 e L4, *Toxocara vitolorum*: adultos.

Parasitas pulmonares

*Dictyocaulus viviparus*: adultos, L4 e estados inibidos.

Larvas (Tórsalo, Nuche, Berne)

*Dermatobia hominis*, *Hipoderma bovis*.

Piolhos

*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurytarnus*, *Solenopotes capillatus*.

Ácaros da sarna

*Psoroptes ovis* (sin. *P. communis* variedade *bovis*); *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*. Ajuda no controle da *Chorioptes Boris*.

Carrapatos

Carrapato comum no gado bovino (*Boophilus microplus*)

Miíases

Ajuda no controle de *Cochliomya hominivorax*.

Ação antiparasitária em ovinos

Parasitas Gastrointestinais

*Teladorsagia circumcincta*: adultos, L3, L4; *Haemonchus contortus*: adultos L3 y L4 (incluindo larvas inibidas); *Trichostrongylus axei*: adultos y L4; *T. colubriformis*: adultos y L4; *Cooperia oncophora*: adultos y L4; *Oesophagostomum spp.*: adultos, L3 y L4; *Nematodirus spathiger*: adultos y L4; *Strongyloides papillosus*: adultos y L4; *Chabertia ovina*: adultos y L4; *Trichuris ovis*: adultos y L4; *Gaigeria pachyscelis*: adultos y L4.

Parasitas pulmonares

*Dictyocaulus filaria*: adultos e L4

Melófagos (Falso carrapato do gado lanar, KED):

*Melophagus ovinus*.

Miíases

*Oestrus ovis*.

## Dosagem e administração

Administrar exclusivamente por via subcutânea, em dose única.

Bovinos: Aplicar no pescoço. Utilizar agulha de calibre 18 a 20.

A dose é de 0,630 mg de ivermectina/kg de peso vivo, equivalente a 1 ml de produto terminado para cada 50 kg de peso vivo.

A dosagem deve ser repetida somente diante de evidências concretas de que o animal está sofrendo de doenças parasitárias provocadas por agentes etiológicos suscetíveis. Os testes de poder residual mostraram que há persistência da droga durante 42 dias em nemátodes.

Ovinos: Aplicar na parte interna da coxa. Utilizar agulha de calibre 12.

A dose é de 1,050 mg de ivermectina/kg de peso vivo, equivalente a 1 ml de produto terminado para cada 30 kg de peso vivo. O produto pode ser aplicado em qualquer comprimento de lã.

Para facilitar o uso do produto

- Ao serem utilizadas seringas multidose, é aconselhável inserir uma segunda agulha na tampa para permitir a entrada de ar, evitando o vácuo que dificulta a manobra. Isto não é necessário no caso de seringas automáticas que são fornecidas com válvula de entrada de ar.
- Proteger o produto contra baixas temperaturas.

### **Apresentação**

Frasco-ampola contendo 50 ml, 500 ml e 1 litro.