

# Meltra® oral

USO VETERINARIO  
Venta bajo receta

Meltra® antiparasitario interno de amplio espectro, es activo contra todos los estadios evolutivos de los parásitos: adultos, larvas y huevos. No requiere de ningún tipo de dieta. No es tóxico ni teratogénico. Se puede administrar en animales de cualquier edad y sexo, como también en hembras preñadas.

## Fórmula

Fenbendazol ..... 10,0 g  
Excipientes c.s.p. .... 100,0 mL

## Indicaciones de uso

Para el tratamiento de las helmintiasis en las siguientes especies animales: Bovinos, Caprinos y Ovinos: *Bunostomum spp.*; *Capillaria spp.*; *Cooperia spp.*; *Dictyocaulus spp.*; *Haemonchus spp.*; *Oesophagostomum spp.*; *Ostertagia spp.*; *Strongyloides spp.*; *Trichostrongylus spp.*; *Trichuris spp.*; *Chabertia ovina*; *Gaigeria pachycelis*. Equinos: Grandes y Pequeños estrongílideos: *Parascaris equorum*; *Oxyuris equi*. Porcinos: *Hyostrongylus rubidus*; *Oesophagostomum spp.*; *Ascaris suum*; *Trichuris suis*; *Metastrongylus spp.*

## Dosis

Bovinos: vía oral o intrarruminal. 5 mL cada 100 kilos de peso (5 mg Fenbendazol/Kg) En caso de *Ostertagia* pre-Tipo II, se recomienda administrar 7,5 mL cada 100 kilos de peso (7,5 mg Fenbendazol/Kg) Caprinos, Ovinos y Porcinos: vía oral. 1 mL cada 20 kilos de peso (5 mg Fenbendazol/Kg). En casos de *Moniezia spp.*: 1 mL cada 10 kilos de peso (10 mg Fenbendazol/Kg) Equinos: vía oral. 7,5 mL cada 100 kilos de peso (7,5 mg Fenbendazol/Kg)

## Precauciones de uso

Mantener fuera del alcance de los niños. No almacenar junto con los alimentos.

## Restricciones de uso

Entre el último tratamiento y el consumo de la carne deberán transcurrir 14 días.  
Para el consumo de leche y su industrialización deberán transcurrir 3 días.

## Tabla de dosificación para bovinos

| Peso en Kg | Dosis en mL | Dosis por envase de 1 lt |
|------------|-------------|--------------------------|
| 100        | 5           | 200                      |
| 200        | 10          | 100                      |
| 300        | 15          | 66                       |
| 400        | 20          | 50                       |
| 600        | 30          | 33                       |

**Temperatura de conservación:** entre 5° y 35°C.

En casos de intoxicación accidental, llamar al médico o concurrir al centro toxicológico más cercano.

**Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel. 0800-333-0160**

Brouwer S.A., empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua.

## ■ SENASA

Certificado N°: 92.062

Est. Elab. N° 4384. Industria Argentina

Dir. Técn.: Dr. Rodolfo A. M. Perotti. Médico Veterinario M.P. N°: 2705

## BROUWER S.A.

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires.

Vtas.: 4554-3891- Dto. Técn.: 4553-6593

Fax: (54-11) 4553-2657

www.brouwer.com.ar

**BROUWER**