

Medicamento anti-infeccioso e cicatrizante ocular para bovinos e ovinos. Solução estéril.

Fórmula

Tilmicosina fosfato	2 g
Caseína hidrolisada	2 g
Excipientes cps	100 ml

Indicações

Midribyl é indicado para o tratamento da ceratoconjuntivite infecciosa e outras infecções oculares de bovinos e ovinos causadas pelos seguintes microrganismos suscetíveis à Tilmicosina:

Moraxella bovis
Pasteurella multocida
Mycoplasma bovoculi
Staphylococcus aureus
Mycoplasma dispar
Streptococcus agalactiae
Chlamydia spp
Histophilus somni (Haemophilus sommus)
Actinomyces pyogenes
Actinobacillus pleuropneumoniae
Erysipelothrix rhusiopathiae
Mannheimia haemolítica
Clostridium perfringens
Fusobacterium Necróphorus

Dosagem e administração

Para o tratamento da ceratoconjuntivite infecciosa bovina e ovina a dosagem é feita com atomizador ou conta-gotas até produzir uma cobertura correta da superfície ocular; em geral, são necessárias de 1 a 3 aspersões de 0,3 mL. O produto deve ser aplicado a cada 12 horas e o tratamento prolonga-se por 4 dias, mas pode se estender, conforme o critério veterinário, até a resolução dos sintomas.

Apresentação

Estojo contendo frasco plástico de 200 mL, com dispositivo atomizador dosificador.