

Power[®] COMPRIMIDOS PALATABLES

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

Power[®] Comprimidos está formulado a base de Spinosad, pulguicida con un nuevo modo de acción producido por una familia de productos naturales derivados de la fermentación del actinomiceto *Saccharopolyspora spinosa*.

Power[®] Comprimidos es un pulguicida sistémico de muy rápida acción, no tóxica, con gran poder de volteo, gran residualidad y de práctica administración en perros.

Fórmula

Cada comprimido contiene:

Spinosad 150 mg, 300 mg, 600 mg, 900 mg, 1200 mg (según la presentación)

Agentes de formulación c.s.p. 1 comprimido de yy mg.

Indicaciones

Power[®] Comprimidos se indica para la prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas, colaborando en la prevención de las enfermedades y zoonosis que estas transmiten. Esto se debe a su muy rápida acción parasiticida, evitando que los parásitos se mantengan sobre el animal, hecho particularmente importante cuando se trata de parásitos hematófagos.

Posee rápida acción sobre las pulgas comunes del perro: *Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*.

Administración y modo de uso

Power[®] Comprimidos se administra por vía oral una vez al mes. Administrar junto con los alimentos o inmediatamente después.

Ofrecer el comprimido a cada animal de acuerdo a su peso para su ingestión voluntaria, ya sea en forma directa o mezclada con el alimento, en caso de no ingerir voluntariamente la dosis, esta se puede administrar por vía oral asegurando la deglución del comprimido.

Dosis

Perros mayores de 14 semanas.

Perros de:	Spinosad por comprimido	Peso total del comprimido
De 2,5 a 5 kg	150 mg	350 mg
De 5,1 a 10 kg	300 mg	700 mg
De 10,1 a 20 kg	600 mg	1400 mg
De 20,1 a 30 kg	900 mg	2100 mg
De 30,1 a 40 kg	1200 mg	2800 mg

Recomendaciones

No utilizar en perros menores de 14 semanas de edad.

No sobrepasar la dosis recomendada.

En casos aislados e individuales, animales sensibles puede presentar vómito.

En este caso, si el vómito sucede menos de una hora después de la administración la dosis debe repetirse.

En caso de sobredosis

La dosis recomendada es de 30 mg/Kg. En la bibliografía del principio activo administrado a dosis superiores a las recomendadas se incluyen los siguientes efectos colaterales en orden decreciente de frecuencia:

En perros: Vomito, efecto colateral frecuente (16%) con dosis de 100 mg/Kg o superiores. Con presentación muy esporádica aunque sin casos en uso clínico se mencionan: depresión o letargia, anorexia, ataxia, diarrea, prurito, temblores, hipersalivación y convulsión.

Precauciones

No se han realizado estudios en perros de menos de 14 semanas de edad ni en hembras gestantes, durante la lactancia ni en machos en servicio. Se recomienda utilizar con precaución en estas categorías. En caso de hipersensibilidad o reacción alérgica al producto, tratar en forma sintomática y no repetir el tratamiento.

Tomar precauciones en perros con antecedentes de epilepsia. En todos los casos se recomienda consultar al veterinario interviniente.

Se recomienda evitar el uso concomitante de Power comprimidos con ivermectina a dosis alta.

Advertencias

Lavarse las manos luego de la administración. No beber, fumar o comer durante su manipuleo. Evitar su