

Power Ultra Spot-on es una formulación sinergizada pulgucida (adulticida y larvicida), garrapaticida, piojicida y acaricida (*Otodectes cynotis*) no tóxica, con poder de volteo y residualidad de práctica aplicación en caninos. Repelente de garrapatas, mosca de la punta de la oreja (*Stomoxys calcitrans*), mosca doméstica, mosquitos (*Culicideos*) y flebótomos (*Lutzomyia longipalpis*).

Fórmula

Imidacloprid [1-(2-cloro-5-piridilmetil)-2-(nitroimino) imidazolina]	5,15 g
Permetrina [2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)Ciclopropil-1-carboxilato-3-fenoxibencilo	40,00 g
Butóxido de piperonilo	3,00 g
Agentes de formulación, c.s.p.	100,00 mL

Indicaciones

Power Ultra Spot-on se indica para la prevención y tratamiento de las infestaciones de diversos ectoparásitos, colaborando en la prevención de las enfermedades y zoonosis que estos transmiten. Esto se debe a que además de acción parasiticida, larvicida y adulticida, presenta acción repelente previniendo que los parásitos se alimenten sobre el animal huésped, hecho particularmente importante cuando se trata de parásitos hematófagos.

Posee acción adulticida y larvicida sobre *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis* y acción garrapaticida (larvicida y adulticida) y garrapatífuga sobre *Rhipicephalus sanguineus*. Posee acción piojicida (larvicida y adulticida) sobre *Trichodectes canis* y acaricida sobre *Otodectes cynotis*.

Repelente de mosquitos (*Culicideos*), mosca de la punta de la oreja (*Stomoxys calcitrans*), mosca doméstica (*Musca domestica*) y flebótomos (*Lutzomyia longipalpis*).

El butóxido de piperonilo actúa como sinergizante de la permetrina, de modo de incrementar la susceptibilidad de insectos y ácaros a la acción de la misma.

Dosificación y modo de uso

El producto es de uso externo. Aplicar la totalidad del contenido a lo largo del cuello, entre la nuca y el comienzo del dorso, separando el pelo y apoyando la pipeta sobre la piel. Se recomienda la aplicación del producto con el animal parado. El pelaje debe estar seco. Evitar el contacto con los ojos y la boca del animal.

Caninos: Mayor de 8 semanas y entre 2 y 4 kg: 1 pipeta con 0,70 ml. De 5 a 10 kg: 1 pipeta con 1,75 ml. De 11 a 20 kg: 1 pipeta con 3,50 ml. De 21 a 40 kg: 1 pipeta con 7,00 ml. De 41 a 60 kg: 1 pipeta con 10,50 ml.

El poder residual pulgucida y garrapaticida varía de 4 a 6 semanas de acuerdo a la infestación del ambiente. Como medida práctica, para asegurar una eficacia contra pulgas y garrapatas junto a una acción repelente de mosquitos, es conveniente repetir la aplicación cada 4 semanas.

Para la repelencia de flebótomos (*Lutzomyia longipalpis*) en áreas endémicas de leishmaniosis visceral canina, se recomienda repetir el tratamiento cada 3 semanas (21 días). El baño con champúes de alto poder tensioactivo puede disminuir la eficacia o acortar el tiempo de residualidad del tratamiento. Por lo tanto, si se baña al animal con frecuencia es conveniente repetir el tratamiento.

Recomendaciones, precauciones y advertencias



NO UTILIZAR EN FELINOS.

No utilizar en cachorros menores de 8 semanas de edad. Los cachorros lactantes se encuentran protegidos por el estrecho contacto con su madre.

En casos aislados e individuales, animales sensibles a los piretroides pueden presentar una reacción de hipersensibilidad en el punto de aplicación.

La formulación tiene un sabor que puede resultar amargo si el animal lame el sitio de aplicación. Por lo tanto, no alarmarse ante la presencia de salivación excesiva inmediatamente después de la aplicación. Esto no es síntoma de intoxicación, y desaparece algunos minutos después sin necesidad de aplicar tratamiento alguno.

Intoxicación en caninos: es de una frecuencia muy baja, siendo más importante en animales muy jóvenes, gerontes o debilitados. La sintomatología de los casos leves (poco frecuentes) incluye hipersalivación



moderada, temblores de orejas, depresión moderada y algunos vómitos o diarrea. En casos graves (muy raros) se presentan ataxia y temblores musculares generalizados. El tratamiento es sintomático, debiendo realizarse un baño con abundante detergente para disminuir la concentración del activo. En general, autolimita en pocas horas. En casos de diarreas o vómitos abundantes: fluidoterapia.

Producto moderadamente tóxico. No beber, fumar o comer durante su aplicación. Lavarse las manos luego de la aplicación. Evitar el contacto con los ojos y con las mucosas.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Evitar su ingestión. No almacenar conjuntamente con alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales. Tóxico para abejas y animales de sangre fría. No contaminar cursos de agua. Si ocurriese ingestión accidental, no provocar el vómito y llamar al Médico.

No existiendo antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático y recurrir a: Centros Toxicológicos: **Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**. Buenos Aires: Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115. La Plata: Hospital de Niños Sor María Ludovica: (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital de Urgencias: (0351) 427-6200. Santa Fe: Hospital Dr. José María Cullen: (0342) 457-3357 int. 268. Salta: Hospital Materno Infantil: (0387) 422-0519. Neuquén: Hospital Regional: (0299) 449-0800.

El envase vacío no constituye un riesgo para la salud pública y puede descartarse con los residuos domiciliarios.

Conservar en su envase original, al abrigo de la luz solar directa y a temperatura ambiente, entre 5° y 30° C.

Presentación

Estuche con pipeta plástica inviolable según peso del animal:

Caninos Mayor de 8 semanas y entre 2 y 4 kg: pipeta con 0,70 ml. De 5 a 10 kg: pipeta con 1,75 ml. De 11 a 20 kg: pipeta con 3,50 ml. De 21 a 40 kg.: pipeta con 7,00 ml. De 41 a 60 kg: pipeta con 10,50 ml.

SENASA

Cert N° 08-047

Estab.Elab: 4384. Industria Argentina

Elaborado por BROUWER S.A.

Director Técnico: Dr. Rodolfo Perotti

Médico Veterinario. M.P: 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires - Argentina.

Tel.: (54-11) 4555-6663. www.brouwer.com.ar