

Antiparasitário externo e interno para bovinos. Solução injetável estéril.

## Fórmula

Doramectina ..... 1 g  
Agentes de formulação c.s.p. .... 100,0 mL

## Indicações

Parasitas Gastrointestinais

*Ostertagia ostertagi*: adultos, L3, L4 (incluindo estados inibidos de *Ostertagia spp*); *Ostertagia lyrata*: adultos e L4; *Haemonchus placei*: adultos L3 e L4; *Trichostrongylus axei*: adultos e L4; *T. colubriformis*: adultos e L4; *T. longispicularis*; *Cooperia oncophora*: adultos e L4; *C. pectinata*: adultos, L4; *C. punctata*: adultos L4; *C. surnabada* (syn. *C. mcmasteri*); *Oesophagostomum radiatum*: adultos, L3 e L4; *Nematodirus helvetianus*: adultos; *N. spathiger*: adultos; *Strongyloides papillosus*: adultos; *Bunostomum phlebotomum*: adultos, L3 e L4; *Trichuris spp*; *Thelazia spp*.

Parasitas Pulmonares

*Dictyocaulus viviparus*: adultos, L4 e estados inibidos.

Ura (Tórsalo, Nuque, Berne)

*Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis*.

Piolhos

*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*.

Ácaros

*Psoroptes ovis* (sin. *P. communis* variedade *bovis*); *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*. Ajuda no controle do *Chorioptes bovis*.

Miasis

*Cochliomya hominivorax*.

## Dose e Modo de uso

Administrar por via SUBCUTÂNEA exclusivamente, em dose única na parte de trás do pescoço.

A dose é de 0,200 mg de doramectina/kg de peso vivo, equivalente a 1 ml de produto terminado por cada 50 kg de peso vivo.

peso (kg)	dose (mL)	peso (kg)	dose (mL)
até 50	1	301 a 350	7
51 a 100	2	351 a 400	8
101 a 150	3	401 a 450	9
151 a 200	4	451 a 500	10
201 a 250	5	501 a 550	11
251 a 300	6	551 a 600	12

Para facilitar o uso do produto:

- Quando são utilizadas seringas multidose, sugere-se colocar uma segunda agulha na tampa para permitir a entrada de ar, evitando o vácuo que dificulta a manobra. Isto não é necessário no caso de seringas automáticas que vêm com válvula de entrada de ar.
- Proteger o produto de baixas temperaturas.

## Apresentação

Frasco de branco de 50 e 500 ml.