

# Promafine®

Tranquilizante e anticinetótico para cães e gatos.  
Solução com sabor para uso oral.

## **Fórmula:**

Maleato de Acepromacina..... 1 g  
Agentes de formulação cps..... 100 ml

## **Indicações:**

Promafine é um derivado da fenotiazina, que age como um neuroléptico e tranquilizante principal. Provoca indiferença aos estímulos externos, sem perda da consciência ou sono. Atarácico, provoca diminuição da atividade motora.

Promafine é indicado como:

- Tranquilizante: em situações onde é necessário atingir um estado de indiferença a estímulos externos ou reduzir a excitabilidade do animal, por exemplo, durante viagens longas, quando há barulhos ou trovoadas, no caso de animais com pouca tolerância ao ruído ou medo de barulhos altos, etc.
- Anticinetótico: sua ação sobre o centro emético do sistema nervoso central permite comprimir e reprimir o reflexo de vômito causado por estímulos central (tontura, viagens e outros).
- Pré-medicação Anestésica: provoca um estado que facilita o manuseio do animal enquanto ele está sendo preparado para a cirurgia ou quando ele deve se submeter a manobras cirúrgicas ou diagnósticas. Sua administração permite reduzir a dose de alguns agentes anestésicos com os quais pode ser combinado.

## **Dosagem e administração:**

**Cães e gatos:** 1 a 3 gotas por kg de peso corporal.

A dosagem depende do efeito desejado e das características individuais de cada animal.

Em geral, é recomendável iniciar a administração com uma dose de 1 gota por kg de peso corporal e avaliar o estado do animal, entre meia e uma hora após a administração. Caso seja considerado necessário aumentar o efeito tranquilizador, a dose pode ser aumentada para um total de 3 gotas por kg.

Quando se busca um efeito anticinetótico, doses mais baixas são adequadas.

Os sinais clínicos máximos da ação da acepromacina têm uma duração aproximada de 3 a 4 horas, embora o efeito continue a ser observado até 7 horas após a administração. A dose pode ser repetida, dependendo do efeito tranquilizante necessário e da duração desejada. A duração recomendada é entre 6 e 8 horas.

A duração do tratamento depende do efeito pretendido, mas, em geral, é usado em tratamentos de dose única.

O produto é administrado exclusivamente por via oral, devendo ser introduzido na boca do animal a ser tratado. O pequeno volume a ser administrado e o aromatizante incluído na fórmula facilitam este processo. No caso de animais indóceis, o medicamento pode ser diluído em uma pequena quantidade de leite ou água, se for possível, para garantir que o animal tenha ingerido a dose completa.

## **Apresentação:**

Conta-gotas contendo 10 ml.