

# Rolenal<sup>®</sup> Comprimidos

Hipnoanalgésico opioide para cães e gatos.

**Fórmula:**

Cada comprimido contém:

Tramadol ..... 50 mg

Excipientes, cps ..... 300 mg

**Indicações:**

O tramadol é indicado na pré-medicação anestésica, a fim de melhorar a analgesia intraoperatória e proporcionar ao paciente uma recuperação confortável. A duração da ação (entre 6 e 8 h) fornece um efeito analgésico importante no período pós-operatório imediato.

É indicado também no tratamento da dor pós-cirúrgica, sendo uma alternativa eficaz em mastectomias ou cirurgias abdominais, traumatológicas e de coluna.

É utilizado no tratamento da dor aguda em diversas síndromes, como a dor osteoarticular e de coluna.

**Dosagem e administração:**

A dose recomendada é de 1 a 2 mg/kg, independentemente da via de administração, embora na dor osteoarticular crônica, possa chegar até os 5 mg/kg.

Portanto, a dose habitualmente recomendada é de um comprimido para cada 25 a 50 kg de peso.

O produto pode ser utilizado no tratamento da dor aguda, no pós-cirúrgico imediato e em tratamentos prolongados. Quando o tratamento é prolongado, sugerimos uma dose inicial de 2 mg/kg a cada 6 h, durante 24 - 48 h, reduzida posteriormente para 1 mg/kg ou administrada em intervalos mais longos de 8 h, conforme com a exigência do caso. A duração do tratamento completo fica a critério do profissional atuante, mas para a dor pós-cirúrgica geralmente são necessários apenas 3 a 5 dias.

**Apresentação:**

Estojo contendo 20 comprimidos multidoses.