

Rolenal[®] Injetável

Hipnoanalgésico opioide para cães e gatos. Solução estéril injetável.

Fórmula:

Tramadol 50 mg
Agentes de formulação cps. 1 ml

Indicações:

O tramadol é indicado na pré-medicação anestésica, a fim de melhorar a analgesia intraoperatória e proporcionar ao paciente uma recuperação confortável. A duração da ação (entre 6 e 8 h) fornece um efeito analgésico importante no período pós-operatório imediato. É indicado também no tratamento da dor pós-cirúrgica, sendo uma alternativa eficaz em mastectomias ou cirurgias abdominais, traumatológicas e de coluna. É utilizado no tratamento da dor aguda em diversas síndromes, como a dor osteoarticular e de coluna.

Dosagem e administração:

A dose recomendada é de 1 a 2 mg/kg, independentemente da via de administração. Portanto, recomenda-se a aplicação de 0,1 ml c/2,5 a 5 kg de peso corporal.

O produto pode ser utilizado para o tratamento da dor aguda, como pré-medicação e para controle da dor durante a cirurgia, no pós-cirúrgico imediato e em tratamentos prolongados. Quando o tratamento é prolongado, embora seja preferível a administração por via oral, em alguns animais pode ser mais conveniente a aplicação injetável. Para estes casos, sugerimos uma dose inicial de 2 mg/kg a cada 6 h, durante 24 - 48 h, reduzida posteriormente para 1 mg/kg ou administrada em intervalos mais longos de 8 h, conforme a exigência do caso. A duração do tratamento completo fica a critério do profissional atuante, mas para a dor pós-cirúrgica geralmente são necessários apenas 3 a 5 dias.

Apresentação:

Frasco-ampola contendo 20 ml.