

Sintomicetina®

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

Antibiótico macrólido de amplio espectro. Caninos y Felinos

Fórmula

Cada comprimido contiene

Azitromicina.....	200 mg
Excipientes	400 mg

Indicaciones de uso

Antimicrobiano - Antibiótico de amplio espectro indicado en caninos y felinos para el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias, con una efectiva penetración en los pulmones, laringe, tráquea y senos paranasales; infecciones de la piel y de sus anexos, tejidos glandulares secretores, mamitis, metritis, infecciones del oído, infecciones de tejidos blandos y duros, sistema osteoarticular, osteomielitis y artritis sépticas y todo proceso infeccioso producido por gérmenes sensibles a la azitromicina.

La azitromicina es particularmente activa contra las bacterias que se indican en una sola toma diaria:

- Infecciones de las vías respiratorias causadas por gérmenes de los géneros *Haemophilus*, *Moraxella* o *Streptococcus*.
- Traqueobronquitis infecciosa (tos de las perreras) causada por *Bordetella bronchiseptica*.
- Neumonías y bronconeumonías causadas o complicadas por microorganismos de los géneros *Bordetella*, *Chlamydia*, *Haemophilus*, *Streptococcus* o *Mycoplasma*.
- Infecciones bucodentales causadas por *Streptococcus sp.*, *Staphylococcus aureus* y otras bacterias comunes.
- Infecciones de las vías respiratorias altas causadas por *Streptococcus pyogenes* como alternativa al tratamiento con Penicilina.
- Piodermas e infecciones de las estructuras cutáneas causadas por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes* o *Streptococcus agalactiae*.
- Otitis externa o media causada por gérmenes de los géneros *Haemophilus*, *Moraxella* o *Streptococcus*.
- Pneumonitis felina por *Chlamydia psitaci*.

Para reducir el riesgo de desarrollo de cepas resistentes a la azitromicina, como a otros antibióticos, la azitromicina deberá ser usada solo para prevenir o tratar infecciones causadas por gérmenes susceptibles o presuntamente susceptibles. Cuando sea posible hacer estudios bacteriológicos (cultivos o antibiograma) se los debe tomar en cuenta para reconfirmar o modificar la terapia antibacteriana aún cuando ésta haya sido iniciada. Cuando no sea posible hacer los estudios bacteriológicos se debe considerar la epidemiología y los patrones de susceptibilidad para seleccionar la terapia en forma empírica y decidir la modificación o continuación de la terapia sobre bases clínicas.

Dosis, vía de administración y modo de uso

Perros y gatos: administración oral.

Tratamiento completo: 30 mg/kg de peso vivo.

En el tratamiento habitual la dosis total de 30 mg/kg se divide en tres tomas de 10 mg/kg cada una con 24 horas de intervalo entre ellas.

En caso de tratamiento de 5 días, se administra 10mg/kg el primer día, seguido de 5mg/kg diarios desde el día 2 al 5.

El comprimido Multidosis permite la correcta dosificación de acuerdo al peso de cada animal disminuyendo la probabilidad de aparición de efectos adversos.

Ver tabla de dosificación:

Dosis en Comprimidos de Sintomicetina			
	Tratam. de 3 días	Tratamiento de 5 días	
Peso en Kg	Dosis cada día	Dosis 1º día	Dosis día 2 al 5
4 a 6 Kg	1/4	x	x
7 a 10 Kg	1/2	1/2	1/4
11 a 15 Kg	3/4	3/4	1/2
16 a 20 Kg	1	1	1/2
21 a 25 Kg	1 1/4	1 1/4	3/4
26 a 30 Kg	1 1/2	1 1/2	3/4
31 a 35 Kg	1 3/4	1 3/4	1
36 a 40 Kg	2	2	1
41 a 50 Kg	2 1/2	2 1/2	1 1/4

En caso de tratamiento de aplicación única, se administra un comprimido cada 6,6 kg de peso. (Tener en cuenta tolerancia gástrica. En caso de vómitos antes de que haya transcurrido 1 h desde la administración se recomienda reiniciar el tratamiento con el esquema habitual de 10 mg/kg durante 3 días.)

En razón de que la eliminación urinaria es escasa y que la metabolización hepática es poca o nula, no es necesario corregir las dosis en caso de disfunción renal o hepática.

Contraindicaciones

No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a la azitromicina y a otros antibióticos del grupo de los macrólidos.

El uso de la azitromicina no está contraindicado en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas a otros grupos de antibióticos.

Limitaciones de uso

Efectos sobre la preñez y reproducción: Los estudios toxicológicos realizados no han demostrado efectos adversos sobre el feto. Pese a lo cual hasta que se demuestre su inocuidad, no se recomienda su uso durante la gestación.

Lactación: La leche de las hembras en lactación tratadas con azitromicina presenta concentraciones importantes del antimicrobiano, por lo cual no se recomienda su uso en hembras durante la lactancia salvo indicación terapéutica específica (mastitis o mamitis).

Efectos colaterales

Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad como anafilaxia aguda, alergia, fiebre, urticaria. Se ha descrito intolerancia gástrica con vómito poco tiempo después de la administración. En caso de vómito pasada 1 hora de la administración no se requiere repetir la dosis. En casos excepcionales puede producir anorexia y diarrea asociada a los vómitos.

La administración por períodos prolongados (no recomendado) puede producir cambios en la flora intestinal y diarrea

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños, animales y personas inexpertas.

Frente a la ingestión accidental o deliberada del producto, concurrir inmediatamente al Médico o al Centro de Toxicología más cercano.

Centro Nacional de Intoxicaciones : Tel. : 0800-333-0160.

Conservación

A temperatura ambiente, entre 4 y 30 °C.

Mantener el producto en su envase original, cerrado y al abrigo de la luz solar directa.

Los envases vacíos no provocan riesgos para la salud pública o el medio ambiente, por lo cual pueden ser descartados con los residuos domiciliarios.

Presentación

6 Comprimidos Multidosis® oblongos trirranurados.

■ SENASA

Certificado N° 11.070.

Est. Elab. N° 4384 - Industria Argentina

Elaborado por BROUWER S.A.

Dir. Téc.: Rodolfo A.M. Perotti. Médico Veterinario M.P. N° 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD). Buenos Aires, Argentina.

Tel.: (54 11) 4555-6663. www.brouwer.com.ar