

# Terpán® 1000 E

USO VETERINARIO  
Venta bajo receta

Producto tóxico.

Terpán 1000 E es un producto de uso ambiental formulado a base de diclorvós (DDVP) indicado para el control de moscas, mosquitos, jejenes, flebótomos, garrapatas y pulgas que infestan los predios, instalaciones y demás sitios habitados y frecuentados por animales.

## Fórmula

Diclorvós (Fosfato de O,O-dimetil y de O-2,2-diclorovinilo) ..... 100 g  
Agentes de Formulación, c.s.p. .... 100 mL

## Indicaciones

Terpán 1000 E está indicado para el control de moscas (*Musca domestica*, *Musca autumnales*, *Stomoxys calcitrans*), mosquitos (*Culex spp*, *Aedes spp*, *Anopheles spp*), jejenes (*Culicoides spp*), flebótomos (*Phlebotomus spp*, *Lutzomya spp*), garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) y pulgas (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*) que infestan los predios e instalaciones de granjas avícolas, granjas y criaderos de porcinos, haras, studs, caballerizas, establos, tambos, cabañas, criaderos de caninos, cuchas, caniles y demás sitios habitados y frecuentados por animales.

## Dosificación y modo de uso

Obtención de la emulsión: diluir 5 mL de Terpán 1000 E en un (1) litro de agua. Terpán 1000 E se agrega con cuidado en la cantidad de agua prefijada, removiendo hasta obtener una mezcla homogénea. Para el control de moscas, mosquitos, jejenes, flebótomos, garrapatas y pulgas: 1 litro de la emulsión cada 80 a 100 m<sup>2</sup>.

Para el control de larvas de moscas: 1 litro de la emulsión cada 10 m<sup>2</sup>.

Se recomienda repetir el tratamiento a los 14 días. Una vez preparada la cantidad necesaria, utilizar en forma de aspersión.

La emulsión debe ser usada dentro de las 24 hs posteriores a su preparación. No aplicar sobre los animales.

## Recomendaciones, precauciones y advertencias

Usar con mucho cuidado. Evitar la ingestión, la aspiración, el contacto con la piel y ojos. Usar ropas de trabajo que protejan toda la superficie de la piel: mamelucos, guantes de goma, botas impermeables, etc.

Si cae producto sobre la piel o las mucosas, lavarse con abundante agua y jabón y cambiarse inmediatamente de ropa. Cambiarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón al finalizar las tareas. No usar pomadas con base grasa o aceite. No beber, fumar o comer durante su aplicación. No permitir el acceso de perros y gatos a lugares que han sido tratados hasta que las superficies asperjadas se encuentren secas. Guardar el resto del producto en su envase original, bien cerrado, alejado de los alimentos.

## VENENO

Manipular con cuidado. Producto inflamable de segunda categoría.

Punto de inflamación entre 21° y 40° C.

No contaminar cursos de agua.

Producto tóxico para abejas y peces.

No almacenar junto con alimentos.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas inexpertas.

Destruir los envases que lo hayan contenido, no guardarlos.



## Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Conservar en su envase original, al abrigo de la luz solar directa, bien cerrado y en lugar seco entre 5° y 30° C.

Brouwer SA, empresa argentina con certificación ISO 9001:2000 de su Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua.

## senasa

Cert N° 04-036

Estab. Elab: 4384

Industria Argentina.

**Elaborado por BROUWER S.A.**

Director Técnico: Dr. Rodolfo A. M. Perotti.

Médico Veterinario. M.P: 2705

Dr. R. Bielsa 232/8: (C1427AZD) Buenos Aires.

Tel.: (54 11) 4555-6663 - [www.brouwer.com.ar](http://www.brouwer.com.ar)