

A Tilmec é uma solução injetável de tilmicosina, pronta para ser usada por via subcutânea numa dose única. Para bovinos

Fórmula

Cada 100 ml de produto contém:

Tilmicosina 30 g
Excipientes q.s.p. 100 ml

Indicações

A tilmicosina é um antibiótico macrolídeo, indicado para bovinos de corte e vacas no período de secagem, para o tratamento da doença respiratória associada com a *Pasteurella* e espécies de *Mycoplasma*. Também é indicada para queratoconjuntivite infecciosa bovina e necrose do casco. A elevada distribuição e penetração em tecidos e sua acumulação intracelular é a grande vantagem que permite ser administrada em dose única e a transforma num recurso terapêutico de escolha para o tratamento de infecções bacterianas, pulmonares, oculares e de cascos. A tilmicosina tem amplo espectro, com uma atividade muito significativa contra bactérias Gram-positivas, determinadas Gram-negativas e micoplasmas: *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Mycoplasma dispar*, *Mycoplasma bovirhinis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcusagalactiae*, *Actinomyces pyogenes*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Moraxella bovis*, *Clostridium perfringens* e *Fusobacterium necrophorum*.

Administração e dosagem

Aplicar somente por via subcutânea.

Para doença complexa respiratória bovina, administrar uma dose única de 1 ml de Tilmec a cada 30 quilos de peso equivalente a 10 mg/kg. Para queratoconjuntivite infecciosa bovina e pododermatite infecciosa (necrose do casco) aplicar uma dose única de 1 ml de Tilmec a cada 30-60 quilos de peso, ou seja, 5-10 mg/kg. Não aplicar mais de 15 ml por local de injeção.

Apresentação

Frasco-ampola contendo 100 ml.