

Triclacine®

USO VETERINÁRIO

Antiparasitário interno, indicado para o tratamento da fasciolíase em bovinos. Suspensão aquosa pronta para usar.

Fórmula

Triclabendazol 10 g.
Agentes de formulação cps. 100 ml.

Indicações

Para o tratamento, prevenção e controle da distomatose aguda e crônica. O produto é eficaz contra todos os estágios dos vermes, incluindo estágios temporários e imaturos dos trematódes. É o produto de escolha para o tratamento de surtos agudos e subagudos e para o controle estratégico das infestações produzidas por *Fasciola spp.*

Seu uso permite controlar as infestações produzidas pelos Trematodes: *Fasciola hepatica* e *Fasciola gigantica* em bovinos.

Dosagem e administração

Administrar por via oral a uma dose de 6 ml para cada 50 kg de peso vivo em bovinos. Isto assegura uma dose de 12 mg/kg de triclabendazol, recomendada internacionalmente para este princípio ativo na espécie mencionada.

No tratamento de surtos agudos, uma dose é suficiente para interromper o ciclo epidemiológico. O reforço do tratamento, em 5 ou 6 semanas, deve ficar a critério do profissional veterinário.

Os tratamentos estratégicos devem ser projetados pelo profissional veterinário especificamente para cada estabelecimento. Em geral, recomenda-se o tratamento no final do inverno ou começo de primavera (setembro), de modo a eliminar os adultos de *Fasciola spp* (instalados no outono) e, desta maneira, evitar a infestação do vetor (*Lymnaea viatrix*; *L. truncatula*; *L. columella*). Se os animais permanecem no mesmo estabelecimento, é conveniente repetir o tratamento no início do verão (dezembro - janeiro), o que não acontece quando os animais são levados para pastagens de inverno. Em todos os casos, é aconselhável repetir o tratamento no final do verão - início do outono (fevereiro - março), podendo ser necessário alguns tratamentos posteriores (até junho) para eliminar parasitas ingeridos na primavera e no verão. Estes tratamentos devem ser complementados por procedimentos de manuseio, como drenagens de campos, limpeza de canais, etc.

Restrições de uso: Pré-abate: 28 dias.

Não utilizar em vacas em produção de leite destinada ao consumo humano.

Apresentação:

Mochila contendo 2,5 litros.

BROUWER