

Vitamínico ADE Plus

USO VETERINARIO
Venta bajo receta
médico veterinaria

Vitamínico ADE Plus Brouwer es una solución inyectable, lista para su uso, estabilizada y destinada a la mayoría de las especies animales.

Fórmula

Cada mL contiene:

Vitamina A (como Palmitato, 1.700.000 U.I. / g)	500.000 U.I.
Vitamina D3 (como Colecalciferol 40.000.000 U.I. / g)	75.000 U.I.
Vitamina E (como alfa Tocoferol acetato 1.000 U.I. / g)	50 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones de uso

Prevención y tratamiento de las avitaminosis ADE.

Favorece el correcto y normal desarrollo en los animales en crecimiento.

Recupera la producción en animales estresados.

Contribuye al restablecimiento de los animales afectados por enfermedades infecciosas ó parasitarias.

Coadyuvante en hembras con baja fertilidad, con alteraciones del ciclo estral, ovulación retardada, atrofia ovárica, retención de placenta, abortos y trastornos en la lactación.

En los machos, como complemento para el tratamiento de la atrofia testicular y disminución de la espermatogénesis.

Para la prevención ante el descenso de los niveles plasmáticos de Vitamina A al post-parto y su aumento en el calostro, mejorando de esta manera la viabilidad y fortaleza de los recién nacidos.

Dosis

Bovinos

Terneros: de 1/2 a 1 mL.

Novillos y Vaquillonas: de 1 a 2 mL.

Vacas: de 2 a 4 mL.

Toros: de 4 a 6 mL.

Equinos

Potrillos: de 1/2 a 1 mL.

Potros: de 1 a 2 mL.

Equinos de cría: de 3 a 6 mL.

Ovinos

Corderos: de 1/4 a 1/2 mL.

Borregos: de 1/2 a 1 mL.

Ovinos adultos: de 1 a 2 mL.

Porcinos

Lechones: de 1/4 a 1/2 mL.

Cachorros: de 1/2 a 1 mL.

Marranas y Padrillos: de 1 a 3 mL.

Modo de uso

Administrar por vía intramuscular profunda o subcutánea.

A bajas temperaturas ambientales se sugiere administrar por vía intramuscular profunda.

De utilizar la vía subcutánea se sugiere entibiar el contenido del frasco (no en baño de agua hirviendo).

Activar la circulación sanguínea en la zona de aplicación previo a la administración.

Utilizar normas de asepsia para productos inyectables.

Precauciones de uso

Ocasionalmente pueden presentarse casos de anafilaxia o alergia. En estas circunstancias tratar inmediatamente con epinefrina o antihistamínicos y suspender la medicación. Mantener fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Conservación

Mantener el envase a temperatura ambiente, entre 4° y 30°C y al abrigo de la luz solar directa.

Presentación

Envase conteniendo 100 mL.



Certificado N° 02-088

Establecimiento Elaborador N° 8325.

Industria Argentina.

BROUWER S.A.

Director Técnico: Dr. Rodolfo Perotti

Médico Veterinario. M.P: 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires. Argentina.

Tel.: (54 11) 4555-6663. www.brouwer.com.ar