

# Derramin® Garrapaticida pour-on

USO VETERINARIO  
Venta bajo receta

Atención: Lea el rótulo. Venta bajo receta

## Indicaciones

Garrapaticida, insecticida y piojicida de amplio espectro indicado para el tratamiento y control de la garrapata (*Boophilus microplus*), mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*), miasis (*Cochliomya hominivorax*), piojos (*Damalinia bovis* y *Liognathus vituli*) y berne ó ura (*Dermatobia hominis*), que infestan a los bovinos (ganado de carne).

## Composición

Cada 100 mL contiene:

Fipronil ..... 1,0 g  
Vehículo c.s.p. .... 100,0 mL

## Dosis y modo de usar

Dosificación: Aplicar 1 mL del producto para cada 10 kg de peso.

Modo de uso: Producto listo para usar. Establecer la dosis de 1 mL/10 kg de peso. Aplicar a lo largo del lomo en una línea desde la cruz (primera vértebra torácica) hasta la base de la cola (última lumbar).

Esquema práctico de dosificación:

Peso (kg)	Dosis (mL)	Peso (kg)	Dosis (mL)	Peso (kg)	Dosis (mL)
Hasta 100	10	250	25	400	40
150	15	300	30	450	45
200	20	350	35	500	50

Para animales de más de 500 kg de peso - aplicar 1 mL cada 10 kg adicionales.

**Porcentaje de Eficacia:** 99,22 %. **Poder residual:** 1 (uno) día

## Restricciones de uso y período de supresión

- No faenar los animales para consumo humano hasta 100 días después de la última aplicación.
- El intervalo entre tratamientos debe ser de al menos dos (2) meses.
- Este producto es para ser utilizado por vía tópica exclusivamente.
- Exclusivo para bovinos de carne. no utilizar en otras especies animales.
- No utilizar en bovinos cuya leche se destine a consumo humano.

## Advertencias y precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No reutilizar el envase vacío.
- Incinerar o enterrar los envases vacíos.
- No almacenar o aplicar cerca de alimentos, bebidas, medicamentos, productos de higiene y domésticos.
- Lavarse las manos después de usar el producto.
- No fumar, beber o comer durante su aplicación.
- En caso de ingestión accidental provocar el vómito y llamar al médico.
- Síntomas: los síntomas de intoxicación no son específicos del producto, pero pueden ocurrir manifestaciones neurológicas, excitación, temblores, sedación excesiva. No se conoce antídoto específico.
- Los efluentes líquidos provenientes de establecimientos tipo feed-lot que hayan usado el producto, no deberán ser evacuados directamente a cursos de agua, pudiendo efectuar el descarte de los mismos por derrame en terreno.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## Presentación

Envase de 2.5 L , suficientes para tratar 125 bovinos de hasta 200kg de peso.

Producto moderadamente tóxico.

**En caso de intoxicación llamar:** en Uruguay: C.I.A.T. tel. 1722 En Argentina: Buenos Aires: Primer centro Nacional de Intoxicaciones: tel. 0800-333-0160, Servicio de toxicología del hospital Posadas: tel. (011) 4658-7777, Cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina (UBA): tel: (011) 4508-3666, Centro de

toxicología del Hospital de Niños: tel: (011) 4962-6666. Hospitales del interior: Hospitales del Interior: Santa Fé: Tel. 0342-4573357. Chaco: Tel. 03722-440127. Mendoza: Tel. 03822-453554. Tucumán: Tel. 0381-4247141. Neuquén: Tel. 0299-4490800. Córdoba: Tel. 0351-4586406. Catamarca: Tel. 03833-437652

Conservar protegido de la luz en lugar fresco, entre 5 °C y 25 °C.

Brouwer S.A. empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua.

Hecho en brasil. Merial saude animal ltda. Faz. Sao Francisco s/n - Paulina - SP CNPJ 57.6000.249/0001-55 Industria Brasileira.

**SENASA**

Ext. Certificado N°99241. Importado desde Brasil  
Establecimiento Fraccionador 4384  
Dir. Técn.: Dr. Rodolfo A. M. Perotti.  
Médico Veterinario M.P. N°: 2705

**BROUWER S.A.**

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires  
Tel.: (54 11) 4555-6663.  
[www.brouwer.com.ar](http://www.brouwer.com.ar)