

Ambramicina lactancia®

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

Composición

Cloxacilina (sódica).....	0,20	g
Ampicilina (sódica).....	0,075	g
Vehículo oleoso suspensionante c.s.p. una jeringa.....	10	mL

Indicaciones

Está indicado para el control de las mastitis producidas por los gérmenes siguientes:

Bacterias gram (+): *Staphylococcus aureus* (incluso cepas penicilina-resistentes) *Streptococcus spp* (incluso enterococos); *Corynebacterium pyogenes*; *Clostridium perfringens*; *Cl. pseudotuberculosis*; *Listeria monocytogenes*; *Bacillus anthracis*.

Bacterias gram (-): *Haemophilus influenzae*; *Escherichia coli*; *Salmonella spp*; *Shigella spp*; *Proteus mirabilis*; *P. morganii*; *Brucella spp*; *Neisseria spp*; *Bordetella pertussis*.

Especies de destino

Bovinos en lactación.

Dosis, modo y vía de administración

Bovinos: 10 ml de Ambramicina Lactancia, o sea 1 inyector por cuarto (equivalente a 75 mg de ampicilina (sódica) + 200 mg de cloxacilina (sódica) por cuarto) cada 12 horas. El tratamiento completo incluye 3 dosis.

Contraindicaciones

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las penicilinas. Animales con historial conocido de alergia a las cefalosporinas deben ser tratados con especial atención.

Interacciones

No administrar conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Sobredosificación

El modo de empleo del producto hace muy improbable una intoxicación por sobredosificación. La dosis máxima tolerable es de 5 veces la recomendada.

Precauciones especiales para su utilización

Los animales deben ser tratados al detectarse los primeros signos de mastitis, siempre durante el período de lactación. Después del ordeño a fondo, antes de aplicar el producto, el cuarto debe ser lavado con una solución antiséptica. Tras aplicar el producto, dar un masaje a la ubre a fin de mejorar la distribución de la suspensión.

Tiempo de espera

Carne: 7 días. Leche: 3 días.

Conservación

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, entre 8° y 25°C.

Presentación

Envase con 24 y 240 jeringas de 10 ml.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Industria Argentina

 **SENASA**

Ext.Cert.N° 97056.

Estab. Elaborador N° 4

BROUWER S.A.

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) - Buenos Aires, Argentina.

Tel.: (54 11) 4555-6663. www.brouwer.com.ar

Dir. Técn.: M.V. Rodolfo A. M. Perotti. M.P. N° 2705