

Ambramicina secado®

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

Composición

Cloxacilina (benzatina) 500 mg
Vehículo oleoso suspensionante, c.s.p. una jeringa..... 10 ml

Indicaciones

Está indicado para el control de las mastitis producidas por los gérmenes siguientes:

Bacterias grampositivas: *Staphylococcus aureus* (incluso cepas penicilina-resistentes), *Streptococcus agalactiae*, *S. uberis*, *S. dysgalactiae*, *Corynebacterium pyogenes*, *Clostridium perfringens*, *C. pseudotuberculosis*, *Bacillus anthracis*.

Bacterias gramnegativas: *Neisseria spp.*

Resistencias

Se han descrito resistencias para todos los géneros sensibles, incluyendo estafilococos penicilinorresistentes (aunque hay cepas sensibles), ya que la resistencia no se relaciona con la producción de la penicilinas. También existen resistencias cruzadas con la nafcilina y la oxacilina.

Especies de destino

Bovinos (vacas lecheras).

Dosis, modo y vía de administración

Bovinos: 500 mg/cuarto (equivalente a 10 ml de Ambramicina Secado®, es decir 1 inyector por cuarto), en dosis única, por vía intramamaria. Previo ordeño a fondo y a través del conducto del pezón, infundir intracisternalmente el contenido de una jeringa de 10 ml por cada cuarto.

Contraindicaciones

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las penicilinas. Animales con historial conocido de alergia a las cefalosporinas deben ser tratados con especial atención.

Incompatibilidades e interacciones

No administrar conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Sobredosificación

El modo de empleo del producto hace muy improbable una intoxicación por sobredosificación.

Tiempo de espera

Carne: 28 días. Leche: 28 días.

En caso de parto prematuro o de aborto, no utilizar la leche para el consumo humano hasta transcurridos 28 días de la aplicación de Ambramicina Secado®.

Conservación

Conservar en lugar fresco y al abrigo de la luz, entre 8° y 25°C.

Precauciones especiales para su utilización

El tratamiento debe realizarse al inicio del período de secado. Después del ordeño a fondo, antes de aplicar el producto, el cuarto debe ser lavado con una solución antiséptica. Tras aplicar el producto, masajear la ubre a fin de mejorar la distribución de la pomada. No administrar a hembras en lactación. El uso del producto en el tratamiento de la mastitis debe acompañarse de las correspondientes medidas higiénicas sanitarias a fin de prevenir la reinfección.

Presentación

Envase con 24 y 240 jeringas de 10 ml.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Industria Argentina



Ext.Cert.N° 96166.

Estab. Elaborador N° 4

BROUWER S.A.

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) - Buenos Aires, Argentina.

Tel.: (54 11) 4555-6663. www.brouwer.com.ar

Dir. Técn.: M.V. Rodolfo A. M. Perotti. M.P. N° 2705