

Carminativo Brouwer Premix

USO VETERINARIO. Venta libre en locales con asesoramiento profesional veterinario.

Fórmula

Macrogol lauril éter 10,00 g
Excipiente vegetal, c.s.p. 100,00 g

Indicaciones de Uso

CARMINATIVO PREMIX BROUWER está indicado para la prevención y control del meteorismo espumoso (empaste) en los bovinos. Brinda protección por 24 Hs.

Dosificación y Modo de Uso

Se recomienda, como dosis mínima, administrar 8 g de producto cada 100 kg de peso vivo por día, solo, mezclado en la ración o con el suplemento mineral. Por ejemplo, una vaca de tambo de 500 kg de peso, debe recibir diariamente 40 g de producto. Si el producto se va a suministrar mezclado con la ración, para calcular la cantidad del mismo a incluir en la preparación del alimento que va a consumirse en el día puede usarse la siguiente fórmula:

$$\text{Cantidad de producto a agregar (kg)} = \frac{\text{Cantidad de alimento (kg)} \times \text{Dosis diaria (g)}}{\text{Consumo diario (kg)} \times 1000}$$

La Cantidad de alimento es el peso del alimento que se va a preparar en el mixer (por ejemplo 1000 kg)

La Dosis Diaria es la dosis en gramos que deben recibir los animales más pesados del lote (por ejemplo, animales de 500 kg requieren 40 g)

El Consumo Diario es la cantidad de alimento que consumen los animales por día (por ejemplo, 5,0 kg)

$$\text{Cantidad de producto a agregar (kg)} = \frac{1000 \text{ kg} \times 40 \text{ g}}{5 \text{ kg} \times 1000}$$

$$\text{Cantidad de producto a agregar (kg)} = 8 \text{ kg}$$

IMPORTANTE

- Se recomienda comenzar el tratamiento al menos 2 días antes de iniciar el pastoreo en potreros con pasturas de riesgo espumante.
- Con alta ocurrencia de empaste, junto a la medicación, realizar un adecuado manejo.
- Esta dosis es indicativa, dado que el potencial de producción de espuma de las pasturas y los alimentos balanceados es muy variable y depende de muchos factores. En caso de observarse animales con sintomatología clínica (aún leve), se debe incrementar la dosis, pudiendo administrarse sin riesgo para los animales hasta 5 veces la dosis mínima recomendada.
- En casos de alto riesgo, es recomendable que la dosis total sea dividida con los distintos alimentos o el agua. De este modo, puede suministrarse, por ejemplo, un 50 % de la dosis total usando Carminativo Premix y asperjar las pasturas y/o tratar el agua a consumir con Carminativo NF o Carminativo NF Max de modo de alcanzar el total de la dosis.
- La dosificación debe ser calculada para ser consumida por los animales en el acto.

Restricciones de uso

Sin restricciones de uso para hembras preñadas.

Sin período de restricción para hembras en ordeño o animales destinados a faena para consumo humano.

Efectos colaterales y secundarios

A las dosis recomendadas no presenta.

Precauciones de uso

Mantener fuera del alcance de los niños, animales y personas inexpertas.

No almacenar junto con los alimentos.

Por ser un producto que produce una irritación moderada, si accidentalmente entra en contacto con los ojos y mucosas, lavar con abundante agua fría y jabón. En casos accidentales de inhalación, efectuar tratamiento sintomático. En casos accidentales de ingestión, administrar agua o leche. No provocar el vómito. Realizar tratamiento sintomático.

Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel N° 0800 - 333 - 0160.

Conservar entre 5° y 30° C

 **SENASA**

Certificado N°: 11-171

Est. Elab. N° 4384

Industria Argentina

Elaborado por BROUWER S.A.

Dir. Técn.: Rodolfo A.M. Perotti.

Médico Veterinario M.P. N° 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires.

Tel.: (54 11) 4555-6663

www.brouwer.com.ar

BROUWER 