

Anti-inflamatório não esteroide, analgésico e antipirético para equinos e bovinos. Solução injetável estéril .

Fórmula

Flunixin (como Megluminato) 5 g
Agentes de formulação, c.s.p. 100,0 mL

Indicações

Em equinos é recomendado para o alívio da inflamação e da dor associada com desordens músculo-esqueléticas. Também é recomendado para aliviar a dor associada à dor abdominal (cólica).

Nos bovinos é recomendado para o controle da piroxia associada à enfermidade respiratória e endotoxemia e mastite aguda. Também é indicado para o controle da inflamação em endotoxemias e para aliviar a dor em desordens músculo-esqueléticas

Dosagem e administração

Equinos:

1-2 ml/50 kg de peso vivo por via endovenosa ou intramuscular (equivalente a 1-2 mg/kg flunixin). Uma vez por dia ou segundo critério do médico veterinário. Evite a via intra-arterial

Bovinos:

1-2 ml/50 kg de peso vivo por via endovenosa ou intramuscular (equivalente a 1-2 mg/kg flunixin). Uma vez por dia ou segundo critério do médico veterinário. Não exceder os 2,2 mg/kg por dia.

Administrar durante um período de 5 dias.

Apresentação

Frasco contendo 50 ml.