

Meltra® Endectocida 3.15%

USO VETERINARIO. Venta bajo receta profesional.

Fórmula

Ivermectina 3,15 g
Agentes de formulación csp. 100,00 mL

Indicaciones

Meltra Endectocida 3,15 es un antiparasitario del grupo de los endectocidas indicado en bovinos y ovinos para el tratamiento y control de los siguientes parásitos:

BOVINOS

PARÁSITOS GASTROINTESTINALES

Ostertagia ostertagi: adultos, L3, L4 (incluyendo estados inhibidos de *Ostertagia spp*); *Ostertagia lyrata*: adultos y L4; *Haemonchus placei*: adultos L3 y L4; *Trichostrongylus axei*: adultos y L4; *T. colubriformis*: adultos y L4; *Cooperia oncophora*: adultos y L4; *C. pectinata*: adultos, L4; *C. punctata*: adultos L4; *Capillaria bovis*: adultos y L4; *Oesophagostomum radiatum*: adultos, L3 y L4; *Nematodirus helvetianus*: adultos; *N. spathiger*: adultos; *Strongyloides papillosus*: adultos; *Bunostomum phlebotomum*: adultos, L3 y L4; *Toxocara vitolorum*: adultos.

PARÁSITOS PULMONARES:

Dictyocaulus viviparus: adultos, L4 y estados inhibidos.

URA (TÓRSALO, NUCHE, BERNE):

Dermatobia hominis, *Hipoderma bovis*.

PIOJOS:

Linognathus vituli, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*.

ÁCAROS DE LA SARNA:

Psoroptes ovis (sin. *P. communis* variedad *bovis*); *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*. Ayuda en el control del *Chorioptes Boris*.

GARRAPATAS:

Garrapata común del ganado bovino (*Boophilus microplus*): MELTRA ENDECTOCIDA 3.15% está aprobado para ser utilizado como garrapaticida bovino en la ZONA DE CONTROL y en ATENCIÓN de FOCOS en la ZONA INDEMNE con Autorización del SENASA.

La Prueba Biológica para determinar la Eficacia de MELTRA ENDECTOCIDA 3.15% se realizó en las instalaciones del Campo Experimental Cambá Punta (Provincia de Corrientes) donde obtuvo un Poder Residual Absoluto de 29 días.

MIASIS:

Ayuda en el control de *Cochliomya hominivorax*.

OVINOS

PARÁSITOS GASTROINTESTINALES:

Teladorsagia circumcincta: adultos, L3, L4; *Haemonchus contortus*: adultos L3 y L4 (incluyendo larvas inhibidas); *Trichostrongylus axei*: adultos y L4; *T. colubriformis*: adultos y L4; *Cooperia oncophora*: adultos y L4; *Oesophagostomum spp.*: adultos, L3 y L4; *Nematodirus spathiger*: adultos y L4; *Strongyloides papillosus*: adultos y L4; *Chabertia ovina*: adultos y L4; *Trichuris ovis*: adultos y L4; *Gaigeria pachyscelis*: adultos y L4.

PARASITOS PULMONARES:

Dictyocaulus filaria: adultos y L4

MELOFAGOS (FALSA GARRAPATA DEL LANAR, KED):

Melophagus ovinus. MELTRA ENDECTOCIDA 3,15 % está aprobado para aplicarse con cualquier largo de lana.

MIASIS:

Oestrus ovis.

Dosis y Modo de uso

Administrar por vía SUBCUTÁNEA exclusivamente, en dosis única.

BOVINOS: Aplicar en la tabla del cuello.

La dosis es de 0,630 mg de ivermectina /kg de peso vivo, equivalente a 1 ml de producto terminado por cada 50 kg de peso vivo, por vía subcutánea.

Tabla orientativa de dosis

Peso (kg)	Dosis (mL)	Peso (kg)	Dosis (mL)
Hasta 50	1	301 a 350	7
51 a 100	2	351 a 400	8
101 a 150	3	401 a 450	9
151 a 200	4	451 a 500	10
201 a 250	5	501 a 550	11
251 a 300	6	551 a 600	12

La dosificación sólo debe repetirse ante evidencias concretas de que el animal está sufriendo enfermedades parasitarias provocadas por agentes etiológicos susceptibles. Las pruebas de poder residual arrojaron resultados de persistencia durante 42 días en nematodos.

OVINOS: Aplicar en la cara interna del muslo.

La dosis es de 1,050 mg de ivermectina/kg de peso vivo, equivalente a 1 ml de producto terminado por cada 30 kg de peso vivo, por vía subcutánea. El producto puede aplicarse con cualquier largo de lana

Tabla orientativa de dosis

Peso (kg)	Dosis (mL)	Peso (kg)	Dosis (mL)
Hasta 10	0,33	51 a 60	2,00
11 a 20	0,66	61 a 70	2,33
21 a 30	1,00	71 a 80	2,66
41 a 40	1,33	81 a 90	3,00
41 a 50	1,66		

Recomendaciones para su aplicación

Aplicar únicamente por vía subcutánea:

- Bovinos: utilizar aguja calibre 18 a 20.
- Ovinos: utilizar aguja calibre 12.

Para facilitar el uso del producto:

- Cuando se utilizan jeringas multidosis se sugiere colocar una segunda aguja en el tapón para permitir la entrada de aire, evitando el vacío que dificulta la maniobra. Esto no es necesario en el caso de jeringas automáticas que vienen provistas de válvula de entrada de aire.
- Proteja el producto de bajas temperaturas.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños, animales y personas inexpertas.

Lavarse las manos antes y después de su uso.

Utilizar equipo estéril de inyección y desinfectar la zona de aplicación para disminuir el riesgo de infección por *Clostridium spp.* En caso de producirse una infección, debe ser inmediatamente tratada con antibióticos adecuados.

En dosis mayores a 10 ml se recomienda dividir la dosis y aplicar en uno o más puntos de inyección.

Dada la vía de aplicación del producto, resulta improbable la administración accidental en el hombre. El producto es de baja toxicidad, no obstante en caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Contraindicaciones y Efectos Colaterales Adversos

No se conocen interacciones con otros medicamentos.

No se han descrito incompatibilidades.

Restricciones de Uso. Tiempo de retiro.

Prefaena: BOVINOS: Entre el último tratamiento y el sacrificio de los animales con destino a consumo alimentario humano deben transcurrir 100 días.

OVINOS: Entre el último tratamiento y el sacrificio de los animales con destino a consumo alimentario humano deben transcurrir 27 días.

Animales en Ordeño: No administrar a hembras lecheras en ordeño cuando se destina la leche a consumo humano, con o sin industrialización previa.

Salvo en el caso mencionado, no presenta restricciones de uso durante la gestación o lactancia.

Conservación

Conservar en su envase original, entre 5° y 35° C y al abrigo de la luz.

Brouwer SA, empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua.

 **senasa**

Certificado N° 09-022

Est. Elab. N° 8169. Industria Argentina

BROUWER S.A.

Dir. Técn.: Rodolfo A.M. Perotti.

Médico Veterinario M.P. N° 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD)

Buenos Aires, Argentina.

Tel.: (54 11) 4555-6663.

www.brouwer.com.ar