

# Meltra<sup>®</sup> Equinos

USO VETERINÁRIO

Antiparasitário interno em pasta para equinos.

## Fórmula

Fenbendazol..... 18,75 g  
Closantel ..... 18,75 g  
Agentes de formulação cps ..... 100,00 ml

## Indicações

Para o tratamento e controle das formas maduras e imaturas das seguintes parasitas que infeccionam os equinos: *Parascaris equorum*, *Habronema sp*, *Oxyuris equi*. Grandes estrogilídeos migratórios: *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equinus*, *Strongylus edentatus*. Pequenos estrogilídeos não migratórios: *Triodontophorus sp*, *Trichonema sp* e formas juvenis de *Gasterophilus nasalis* e *Gasterophilus intestinalis*.

Meltra Equinos é indicado para o tratamento preventivo do aneurisma verminoso, produzido pelas larvas migratórias do *Strongylus vulgaris*.

Pode ser usado em animais de qualquer idade e sexo. Não afeta a fertilidade no macho nem a prenhes na fêmea, em qualquer etapa da gestação. Não possui efeitos embriotóxicos nem teratogênicos sobre as crias. Não contém fosforado.

## Dosagem e administração

Admistra-se por via oral: introduzir a cânula da seringa dosadora dentro da boca e comprimir o êmbolo lentamente. Por sua formulação de consistência semissólida, Meltra Equinos adere à mucosa bucal, evitando perdas, assegurando a dose certa.

O conteúdo da seringa de 20 ml de Meltra Equinos é o bastante para o tratamento de um equino de 500 kg. Para dosar, use a escala impressa no êmbolo que começa com o número 100 e vai até o 500, numeração que indica o peso do animal a ser tratado.

### Repetição do tratamento:

Como preventivo do aneurisma verminoso, repetir o tratamento aos 60 dias. Como preventivo das formas juvenis de *G. nasalis* e *G. intestinalis*, administrar a cada 60 dias durante a primavera e o verão.

## Apresentação

Seringa descartável com 20 ml.

**BROUWER**