

# Neuroalivio<sup>®</sup>

USO VETERINARIO  
Venta bajo receta

Modificador de la conducta. Ansiolítico no sedante no benzodiazepínico para caninos.  
Comprimidos palatables.

## Fórmula

Cada comprimido contiene:

Buspirona ..... 40,0 mg

Excipientes c.s.p. .... 2000,0 mg

## Indicaciones

Neuroalivio Canino es un modificador de los trastornos de la conducta animal, provocados por los estados de ansiedad leve o moderado como: - Ansiedad por separación que se manifiesta por ejemplo como: daños cometidos durante la ausencia de sus dueños, ladridos y aullidos persistentes, deposiciones y micciones en lugares inapropiados, excluido el marcaje normal de los machos.- Trastornos compulsivos que se manifiestan por ejemplo como: persecución del rabo, granuloma acral por lamido, lamido de los flancos. - Agresión dominante o por miedo que se manifiesta por ejemplo como: gruñidos de amenaza al recibir órdenes, falta de obediencia. - Trastornos de adaptación ante nuevas situaciones por ejemplo como: nuevos integrantes de la casa (bebé, nuevos animales), ausencias temporarias o definitivas de algún miembro del grupo familiar, adaptación a cambios de ambientes. - Conductas temerosas leves que se manifiestan por ejemplo como: negación a salir del ambiente habitual, dificultad de deambular durante el paseo. - Neuroalivio Canino también facilita el aprendizaje corrector de los trastornos de comportamiento.

**Nota importante:** Para lograr la máxima acción terapéutica de Neuroalivio Canino se recomendará acompañar el tratamiento con la terapia correctiva del trastorno presente.

## Dosis y Modo de uso

Caninos: 2 a 4 mg/kg por día la cual se dividirá en dos tomas con 12 horas de intervalo. Dicha dosis diaria equivale a medio (1/2) comprimido cada 12 horas para 10 a 20 kilos de peso. La buspirona necesita aproximadamente 15 días para actuar plenamente como modulador de la serotonina a nivel cerebral, por lo tanto la respuesta clínica esperada es creciente en forma paulatina y se hace evidente para el propietario a partir de los 15 a 30 días de comenzado el tratamiento. La dosificación aquí indicada es orientativa y es la que genera respuesta en la mayoría de los casos. La duración del tratamiento dependerá de la causa clínica y la respuesta del paciente a la medicación.

## Características y propiedades

Neuroalivio Canino carece de acción sedante, relajante muscular y anticonvulsivante. No impide la realización de acciones motoras ni disocia al animal del medio ambiente, permitiéndole aprender nuevas conductas. Neuroalivio Canino permite al animal tener la lucidez necesaria para modificar su conducta. Neuroalivio Canino, por no ser una benzodiazepina, no posee sus efectos colaterales, dependencia a la droga, somnolencia, efecto rebote, fatiga. Neuroalivio Canino, por no ser un antidepresivo tricíclico, tampoco posee sus efectos colaterales: somnolencia, sequedad de boca, náuseas, aumento de peso, diarrea, inestabilidad, movimientos lentos, hipotensión. A diferencia de otros ansiolíticos, Neuroalivio Canino se puede suspender bruscamente, sin generar efectos secundarios indeseables. De acuerdo a la gravedad del caso, puede asociarse con otros psicofármacos como Diazepam, el cual deberá utilizarse en dosis decrecientes durante quince días a un mes. Neuroalivio Canino no tiene efecto sobre desórdenes asociados a estados de pánico. En pacientes medicados durante largos períodos con benzodiazepinas, Neuroalivio Canino parece tener menor efecto terapéutico.

## Contraindicaciones

No utilizar en hembras preñadas y/o en lactación. No utilizar en pacientes con hipersensibilidad a la Buspirona. No administrar en pacientes con insuficiencia renal o hepática. No administrar en animales que ingieren drogas inhibitoras de la monoaminoxidasa (IMAO).

## Efectos adversos

Frente a casos de sobredosificación accidental puede presentarse un aumento de la prolactina y de la hormona de crecimiento. Eventualmente pueden presentarse casos de vómitos en las primeras tomas, lo cual se soluciona con la administración previa de Metoclopramida durante dos días. Muy rara vez puede presentarse sequedad de boca y diarrea.

Ante casos de intoxicación, suspender la administración y aplicar tratamiento sintomático. Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas inexpertas. En caso de intoxicación accidental o deliberada en el hombre, concurrir a un centro hospitalario. Una vez utilizado el producto, el envase vacío se envolverá en varias hojas de papel, para finalmente ser colocado en el recipiente para residuos.

#### **Conservación**

Mantener en su envase original, cerrado, al abrigo de la luz solar directa y de la humedad entre 4° y 35° C.

#### **Presentación**

Envases de polietileno conteniendo 30 comprimidos palatables birranurados.

#### **SENASA**

Certificado N° 01-052

Est. Elaborador N° 4384

Industria Argentina

#### **Elaborado por BROUWER S.A.**

Dir. Téc.: Rodolfo A.M. Perotti. Médico Veterinario M.P. N° 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD). Buenos Aires, Argentina.

Tel.: (54 11) 4555-6663. - [www.brouwer.com.ar](http://www.brouwer.com.ar)