

Antimicótico, Antibiótico, Antiparasitario externo, Antiinflamatorio esteroide.
Solución ótica. Para Caninos y Felinos.

OPTER es una solución ótica, de amplio espectro de uso en caninos y felinos, para combatir las otitis de origen micótico, bacteriano o alérgico, así como las otitis causadas por *Otodectes spp*.

Fórmula

Cada 100 ml contiene:

Enrofloxacin.....	0,50 g
Clotrimazol.....	1,00 g
Ivermectina.....	0,03 g
Betametasona (como valerato).....	0,10 g
Excipientes, c.s.p.....	100,00 ml

Indicaciones

Para el tratamiento de otitis infecciosas, micóticas y parasitarias que afectan a caninos y felinos. Posee acción antiinflamatoria local, por lo cual calma el prurito y el dolor característicos de estas patologías.

Agentes etiológicos sensibles

La presencia de **clotrimazol** lo hace efectivo para el tratamiento de infecciones micóticas y por levaduras como: *Microsporium spp*, *Candida albicans*, *Trichophyton spp* y *Malasesia spp*.

La **enrofloxacin** permitirá combatir a los agentes bacterianos susceptibles, más comúnmente asociados a otitis externas sépticas como: *Pseudomona spp*, *Proteus spp.*, *Staphylococcus spp* y *Streptococcus spp*.

La **ivermectina** será activa para controlar las otitis parasitarias causadas por ácaros como: *Otodectes spp*.

Dosis, vía de administración y modo de uso

El producto se aplica localmente en el conducto auditivo externo. Dependiendo del tamaño del animal a tratar se deben instilar de 6 a 12 gotas dentro del mencionado conducto auditivo externo y masajear, de modo de promover la adecuada difusión de los activos. Las aplicaciones deben repetirse una o dos veces por día, de acuerdo a las características del caso y el tratamiento se prolongará hasta la desaparición de los síntomas o el momento en que se considere necesario modificar el mismo. Como indicativo, se sugiere una duración mínima del tratamiento de:

Para otitis infecciosas: Tratar por 7 a 14 días

Para otitis parasitarias (*Otodectes spp*): Un solo tratamiento suele ser suficiente.

Para otitis micóticas: 30 días.

Siempre es conveniente extender el tratamiento por unos días luego de la remisión de las lesiones, particularmente en el caso de otitis micóticas

Precauciones

Queda bajo el exclusivo criterio del Médico Veterinario el uso de este producto en perros de las razas Collie, Border Collie y sus cruas, debido a la mayor susceptibilidad que presentan ante la Ivermectina.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Frente a la ingestión accidental o deliberada del producto, concurrir inmediatamente al Médico o al Centro de Toxicología más cercano.

Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.

Contraindicaciones

No posee.

Efectos colaterales posibles

No se han descrito.

Presentaciones

OPTER se presenta en envases de 25 ml

Conservación

Mantener el producto en su envase original, al abrigo de la luz solar directa y a temperatura ambiente, entre 5° y 30° C.

No congelar ni refrigerar.

Luego de utilizado el producto, debe destruirse el envase vacío.

■ SENASA

Certificado N° 11-212

Est. Elab. N° 4384. Industria Argentina

BROUWER S.A.

Dir. Técn.: M.V. Rodolfo A.M. Perotti M.P. N° 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires.

Tel.: (54 11) 4555-6663.

www.brouwer.com.ar