

Power spot-on es una formulación pulgucida, adulticida y larvicida, no tóxica con gran poder de volteo y excelente residualidad de muy práctica aplicación en felinos.

Fórmula

Imidacloprid [1-(2-cloro-5-piridilmetil)-2-(nitroimino) imidazolina] 8,00 g.
Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Indicaciones

Power spot-on está indicado para la prevención y el tratamiento de la infestación por pulgas del gato (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*), a partir de los 2 y 1/2 meses de edad.

Dosificación y Modo de uso

A - El producto es de uso externo tipo "spot-on". Se aplicará de manera tópica sobre la piel del animal, debiéndose separar el pelo en el punto de aplicación para que el producto tome contacto directo con la piel.

B - En los felinos hasta 4 kg se aplicará 1 pipeta de 0,5 mL en la nuca.

C - En los felinos de 4 a 8 kg se aplicará 1 pipeta de 1 mL en la nuca.

Es recomendable la aplicación del producto con el animal parado. El pelaje debe estar seco. Evitar el contacto con los ojos y la boca del animal.

Una aplicación de este producto actúa como pulgucida y larvicida, y previene la infestación por pulgas por un período de hasta 4 semanas (28 días). El baño higiénico o medicado, o una exposición intensa a la lluvia puede disminuir la eficacia o acortar el tiempo de residualidad del producto. Por lo tanto, si el animal es frecuentemente bañado o ha estado expuesto a la lluvia intensa, es conveniente repetir el tratamiento.

El tratamiento deberá mantenerse durante el tiempo que sea necesario, mientras exista infestación con pulgas o según criterio del Médico Veterinario.

Recomendaciones, Precauciones y Advertencias

La aplicación del producto en gatitos deberá realizarse únicamente a partir de las 10 (diez) semanas de edad ó 2 y 1/2 kilos de peso.

Los cachorros lactantes se encuentran protegidos por el estrecho contacto con su madre. Dado que la formulación tiene un sabor que puede resultar amargo si el animal lame el sitio de aplicación, no debe alarmar la presencia de salivación excesiva inmediatamente después de la aplicación. Esto no es síntoma de intoxicación y desaparece algunos minutos después, sin necesidad de aplicar tratamiento alguno. Producto moderadamente tóxico. No beber, fumar o comer durante su aplicación. Lavarse las manos luego de la aplicación. Evitar el contacto con los ojos y con las mucosas. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Evitar su ingestión. No almacenar conjuntamente con alimentos.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales.

Si ocurriese ingestión accidental, no provocar el vómito y llamar al Médico. No existiendo antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático y recurrir a un centro toxicológico:

Centro Toxicológico




Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Una vez utilizado el producto, el envase vacío deberá envolverse en varias hojas de papel y ser colocado en el recipiente de residuos.

Conservar en su envase original, al abrigo de la luz solar directa, bien cerrado y en lugar seco entre 5° y 30° C.

Presentación

Estuche con pipeta plástica inviolable de 0,5 mL o 1 mL.





Certificado N°: 99.032

Est. Elab. N°: 4.384. Industria Argentina

Elaborado por BROUWER S.A.

Dir. Técn.: Dr. Rodolfo A.M. Perotti

Médico Veterinario. M.P. N°: 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD)

Buenos Aires - Argentina

Te.: (54 11) 4555-6663

www.brouwer.com.ar