

## Fórmula

Cipermetrina (2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil) ciclopropil carboxilato de alfa-ciano-3 fenoxibencilo) .....	5,6 g
Diazinón (Tionofosfato de O,O dietilo-O-(2- isopropil-4-metil)-6-pirimidilo).....	56 g
Excipientes c.s.p.....	100 mL

## Indicaciones

Antisárnico, piojicida para bovinos, equinos y porcinos. Controla la Mosca del cuerno de los bovinos. Control de moscas spp. y otros insectos sobre las instalaciones relacionadas con las especies mencionadas.

## Dosificación

Antisárnico, mosca del cuerno, control de moscas spp y otros insectos: 145 mL en 200 L de agua. Piojicida: 145 mL en 400 L de agua.

## Preparación

Volcar Tipertox sobre el agua, agitando hasta lograr una emulsión homogénea. No efectuar premezclas.

## Aplicación

Antisárnico: 2 tratamientos con 10 a 12 días de intervalo. Los animales deben quedar mojados. Ante lesiones costrosas "cepillar" con cepillo o rasqueta hasta romperlas.

Piojicida: Un solo tratamiento es suficiente. Repetir en caso de reinfestaciones.

Mosca del cuerno: mojar todo el animal. Repetir en caso de reinfestaciones.

Moscas spp y otros insectos: asperjar las instalaciones (pisos, techos, paredes, pasillos) y conos de estiércol cada 10 a 20 días. Repetir frente a reinfestaciones. En el caso de lluvias post tratamiento, deberá repetirse. Tipertox debe ser utilizado dentro de las 24 hs de ser preparado.

## Síntomas de intoxicación

Malestar, náuseas, vómitos, diarreas, sudoración, miosis, edema pulmonar, colapso, coma. En casos de ingestión no provocar el vómito. Llamar al médico.

## Advertencia para el médico

Aplicar antídoto para fosforados: sulfato de atropina. Humanos 1 por mil, animales 1 por ciento.

## Centros toxicológicos

Centros toxicológicos: **Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.** Buenos Aires: Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115. La Plata: Hospital de Niños Sor María Ludovica: (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital de Urgencias: (0351) 427-6200. Santa Fe: Hospital Dr. José María Cullen: (0342) 457-3357 int. 268. Salta: Hospital Materno Infantil: (0387) 422-0519. Neuquén: Hospital Regional: (0299) 449-0800.

## Restricciones de uso

Carne 28 días; leche 10 días entre el último tratamiento y el consumo humano.

## Precauciones: VENENO

No ingerir. Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos. Usar guantes de goma y antiparras, si cae sobre la piel o mucosas, lavar con agua y jabón. Cambiar de ropa. No beber, fumar o comer durante su aplicación.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No almacenar junto a los alimentos. No pulverizar contra el viento. Destruir los envases luego de su uso.

## ■ SENASA

Certificado N°: 1772.

Est. Elab. N°: 4384 - Industria Argentina

## Elaborado por BROUWER S.A.

Dir. Técn.: M.V. Rodolfo A.M. Perotti M.P. N°: 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD). Buenos Aires.

Tel.: (54 11) 4555-6663

www.brouwer.com.ar