

Tipertox[®] pour-on

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

Atención: Lea el rótulo y respete estrictamente las instrucciones.

Fórmula

Clorpirifós: (Fosforotioato de O - O-dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridilo) 15,0 g
Vehículo csp. 100,0 mL

Indicaciones, dosificación y modo de uso

Tratamiento y control de la mosca del cuerno y de los piojos masticadores y chupadores en bovinos (terneros, vaquillonas, novillitos, novillos y vacas).

Dosificación	
Animales menores a 100 kilos	No aplicar
Animales de 100 a 199 kilos	5 mL
Animales de 200 a 399 kilos	10 mL
Animales de más de 400 kilos	20 mL
Toros (cualquier peso)	No aplicar

Tipertox pour on se aplica tal cual, directamente sobre la piel del animal. Distribuir el producto desde la cruz hasta la cola con el envase dosificador. Algunos solventes de Tipertox pour on se evaporan rápidamente y pueden causar una sensación de frío en la espalda del animal. Esta puede manifestarse mediante una ligera y transitoria irritación de la misma.

Intervalo entre tratamientos

Mosca del cuerno: repetir el tratamiento cuando la población de moscas alcance el número mínimo de 200 moscas por animal, respetando siempre un lapso no inferior a los 30 días como mínimo entre 2 tratamientos. Piojos masticadores y chupadores: no es necesario repetir el tratamiento. Para prevenir reinfestaciones, es esencial tratar a todos los animales del establecimiento.

Restricciones de uso

Ganado de carne: entre el último tratamiento y el consumo humano deberán transcurrir 35 días. Ganado de leche: no utilizar en vacas en producción cuya leche es destinada al consumo humano. En las distintas categorías de ganado de leche que no se encuentren en lactación puede utilizarse el producto respetando las indicaciones e instrucciones de la etiqueta.

Advertencias

No utilizar en toros, ni en animales menores a 6 semanas de edad o menos de 100 Kg de peso. No utilizar con otros principios activos organofosforados y/o carbamatos dentro de los 30 días desde el último tratamiento. No aplicar sobre animales mojados porque interfiere la distribución del producto sobre la piel. No tratar animales enfermos, flacos o con problemas hepáticos. No tratar en horas de intenso calor ni cuando la hacienda está muy cansada. Las lluvias pueden disminuir el poder residual del producto.

Precauciones generales

Mantener en su envase original. Peligrosa su ingestión, aspiración y contacto con la piel. Guardar bajo llave, mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Evitar la contaminación de los alimentos. No almacenar o transportar junto con los alimentos. Destruir los envases que lo hayan contenido, no guardarlos y enterrarlos a no menos de un metro de profundidad y agregar cal o soda cáustica sobre los mismos. Producto tóxico sobre abejas y peces. No contaminar estanques o cursos de agua.

Precauciones durante el uso

Usese con cuidado. Utilizar ropas de trabajo que protejan toda la superficie de la piel, mameluco, guantes de goma, botas impermeables, máscaras protectoras. Cambiarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón al finalizar las tareas. Si cae producto sobre la piel o mucosas, lavarse con abundante agua y jabón y cambiarse inmediatamente. No fumar, beber o comer durante el trabajo. Guardar el resto de Tipertox pour on en su envase original, bien cerrado. No usar pomadas con base grasa o aceites.

Primeros auxilios: Si hubo ingestión: proporcionar atención médica inmediatamente. No provocar vómito, no dar de beber leche, sustancias grasas o aceites. Si hubo contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos. Si hay irritación, acudir al médico. Si hubo contacto con la piel: quitar la ropa y lavar con agua y jabón todas las partes afectadas. Dar atención médica si la piel está irritada.

Advertencia para el medico: VENENO. Producto leve a moderadamente tóxico (clase II - III) (OMS). Producto

órganofosforado: inhibe la acetilcolinesterasa. Síntomas: Mareos, náuseas, vómitos, diarreas, sudoración, lagrimeo y salivación abundantes, miosis, pulso lento, convulsiones, dificultad respiratoria, coma. Tratamiento médico: Humanos: Antídoto: Sulfato de atropina al 1 por mil. Rescatar el tóxico mediante lavado gástrico y aspiración. Administrar vía intravenosa o subcutánea de 2 a 6 mg de Sulfato de atropina hasta la desaparición de los síntomas (2 mg cada 5 a 10 minutos). Continuar con tratamiento sintomático y de sostén. Animales: tratar con Sulfato de atropina al 1 % (1 ml cada 100 kilos) hasta la desaparición de los síntomas. Continuar con tratamiento sintomático y de sostén.

Consultas en casos de intoxicaciones: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Buenos Aires: Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115. La Plata: Hospital de Niños Sor María Ludovica: (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital de Urgencias: (0351) 427-6200. Santa Fe: Hospital Dr. José María Cullen: (0342) 457-3357 int. 268. Salta: Hospital Materno Infantil: (0387) 422-0519. Neuquén: Hospital Regional: (0299) 449-0800.

Conservación

A temperatura ambiente, entre 5º y 30º C.

BROUWER S.A. no se responsabiliza por los daños o perjuicios que pudieran resultar del uso distinto al indicado en el rótulo.

BROUWER S.A., empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua.

■ senasa

Certificado N°: 03-196
Est. Elab. N° 4384
Industria Argentina



Elaborado por BROUWER S.A.

Dir. Técn.: Dr. Rodolfo A. M. Perotti.
Médico Veterinario M.P. N°: 2705
Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires. Argentina.
Tel.: (54 11) 4555-6663 - www.brouwer.com.ar