

Triclacine®

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

Fórmula

Triclabendazol 10 g
Excipientes 100 mL

Indicaciones

TRICLACINE 10 está indicado para el tratamiento, prevención y control de la distomatosis tanto aguda como crónica. El producto es eficaz contra todos los estadios, incluyendo tempranos e inmaduros, de los trematodes, lo que lo convierte en el producto de elección para el tratamiento de brotes agudos y subagudos y para el control estratégico de las infestaciones producidas por *Fasciola spp.*

Su uso permite controlar las infestaciones producidas por los Trematodes: Fasciola hepática y Fasciola gigantica en Bovinos

Dosis y modo de uso

Para obtener un efecto adulticida y sobre larvas de más de 4 semanas, TRICLACINE 10 se administra por vía oral a una dosis de 10 mL cada 100 kg de peso vivo. En caso de bovinos expuestos a una infestación severa durante las últimas 4 semanas se recomienda incrementar la dosis a 6 mL cada 50 kg de peso vivo en bovinos. Esto asegura una dosis de 12 mg/kg de triclabendazol, dosis recomendada internacionalmente para este principio activo en la mencionada especie. En el tratamiento de brotes agudos, una dosis es suficiente para interrumpir el ciclo epidemiológico. El refuerzo del tratamiento, a las 5 o 6 semanas, debe quedar a criterio del profesional veterinario.

Tabla de dosificación

PESO VIVO (Kg)	DOSIS (mL)	PESO VIVO (Kg)	DOSIS (mL)
100	10	350	35
150	15	400	40
200	20	450	45
250	25	500	50
300	30		

Los tratamientos estratégicos deben ser diseñados por el profesional veterinario específicamente para cada establecimiento. En general se recomienda tratar a fin de invierno, comienzo de primavera (septiembre), de modo de eliminar a los adultos de *Fasciola spp.* (instalados en el otoño) y, de esta manera, evitar que se infeste su vector (*Lymnaea viatrix*; *L. truncatula*; *L. columella*). Si los animales permanecen en el mismo establecimiento, es conveniente repetir el tratamiento a comienzos del verano (diciembre - enero), lo que no sucede cuando los animales son trasladados a pastos de veranada. En todos los casos, se sugiere que se repita el tratamiento a fines del verano - comienzos del otoño (febrero - marzo), pudiendo ser necesarios algunos tratamientos posteriores más (hasta junio) para eliminar a los parásitos ingeridos en la primavera - verano. Estos tratamientos deben complementarse con maniobras de manejo como drenajes de campos, limpieza de canales, etc.

Contraindicaciones y limitaciones de uso

No presenta.

Intoxicación y sobredosis en los animales

Usado como se indica, el producto es seguro. La sobredosis (16 veces o más la dosis indicada) se manifiesta con reducción del apetito, pérdida de peso transitoria y algunos efectos leves en la actividad motora y en los niveles de lactato deshidrogenasa sérica (LDH). No existen antidotos, debiendo suministrarse tratamiento sintomático.

Precauciones de uso

Agite bien antes de usar.

La manipulación del producto no presenta riesgos para el operador. Ante cualquier duda, consulte al **Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel N° 0800-333-0160**. Mantener fuera del alcance de los niños.

Restricciones de Uso

Prefaena: 28 días. No utilizar en vacas en producción de leche destinada a consumo alimentario humano.

Conservación

Conservar en su envase original, a temperatura ambiente, entre 5° y 35°C.

Brouwer S.A., empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua.

SENASA

Certificado N°: 05-116

Est. Elab. N° 4384 - Industria Argentina

Elaborado por BROUWER S.A.

Dir. Técn.: Dr. Rodolfo A. M. Perotti.

Médico Veterinario M.P. N°: 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires. Argentina.

Tel: (54 11) 4555-6663 - www.brouwer.com.ar