



OCLADERM

Dermatológico.

Uso en medicina veterinaria. Venta bajo receta.

Antipruriginoso oral para caninos.

Comprimidos ranurados a la mitad.

Composición

Cada comprimido de 103 mg contiene 3,6 mg de Oclacitinib como Oclacitinib maleato.

Cada comprimido de 154 mg contiene 5,4 mg de Oclacitinib como Oclacitinib maleato.

Cada comprimido de 457 mg contiene 16 mg de Oclacitinib como Oclacitinib maleato.

Indicaciones

Ocladerm está indicado para el tratamiento del prurito relacionado con dermatitis alérgica en perros y para el control de las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica en perros a partir de los 12 meses de edad.

Dosificación y modo de uso

Ocladerm debe administrarse a razón de 0,4 - 0,6 mg de oclacitinib/ kg de peso corporal, por la vía oral, dos veces por día (cada 12 horas), por hasta 14 días. Luego se debe pasar a una dosis de mantenimiento de una toma diaria (0,4 - 0,6 mg/kg cada 24 horas). El comprimido se puede administrar con o sin el alimento.

La duración del tratamiento será variable según la evolución del cuadro clínico y criterio del médico veterinario actuante.

Tabla orientativa de dosis	Presentación		
	Comp. x 3,6 mg	Comp. x 5,4 mg	Comp. x 16 mg
3,0 - 4,4	½		
4,5 - 5,9		½	
6,0 - 8,9	1		
9,0 - 13,4		1	
13,5 - 19,9			½
20,0 - 26,9		2	
27,0 - 39,9			1
40,0 - 54,9			1 ½
55,0 - 80,0			2

Contraindicaciones

No usar en casos de hipersensibilidad a Oclacitinib.

No usar en perros menores de 12 meses de edad o menores de 3 kg de peso corporal.

No usar en perros con inmunosupresión a hiperadrenocorticismos.

No usar en perras gestantes o en lactación, pues no han sido estudiados los efectos de oclacitinib en estos estados ni en machos destinados a la reproducción.

Precauciones y advertencias

Ocladerm modula el sistema inmune y puede incrementar la susceptibilidad a infecciones y desarrollo de papilomas.

Advertencias para el usuario

En caso de ingestión accidental o intencional, lávese la boca, no provocar el vómito y llamar al Médico. No existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.


Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Evitar el contacto con los ojos. No comer, beber o fumar durante su uso o manipuleo. Lavarse las manos con abundante agua luego de manipular el producto. No re-utilizar los envases vacíos. Destruir los envases vacíos y desecharlos evitando la contaminación del medio ambiente. No arrojar remanentes del producto en cuerpos de agua o ríos. No almacenar junto con alimentos, medicamentos humanos, productos de higiene, bebidas o utensilios domésticos.

No conservar por encima de los 30°C. Mantener en su envase original cerrado, en lugar seco y fuera de la luz solar directa. Los envases utilizados deberán ser descartados según la legislación vigente.

Presentaciones

Ocladerm se presenta en estuches individuales con prospecto y blisters conteniendo 10 - 20 - 30 comprimidos.

 **senasa** - Certificado N° 21-037.
Est. Elab. N° 4384. Industria Argentina.

BROUWER S.A.

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD).
Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54 11) 4555-6663.
www.brouwer.com.ar