



OCLADERM

Dermatológico.
Uso em medicina veterinária.
Venda somente com prescrição.
Antipruriginoso oral para cães.

Composição

Cada comprimido de 103 mg contém 3,6 mg de Oclacitinib como Oclacitinib maleato.
Cada comprimido de 154 mg contém 5,4 mg de Oclacitinib como Oclacitinib maleato.
Cada comprimido de 457 mg contém 16 mg de Oclacitinib como Oclacitinib maleato.

Indicações

O Ocladerm é indicado para o tratamento do prurido relacionado à dermatite alérgica em cães e para o controle das manifestações clínicas da dermatite atópica em cães a partir dos 12 meses de idade.

Dosagem e modo de uso

O Ocladerm deve ser ministrado na proporção de 0,4 - 0,6 mg de oclacitinib/kg de peso corporal, por via oral, duas vezes por dia (a cada 12 horas), por até 14 dias. Posteriormente, deve-se passar a uma dose de manutenção com uma administração ao dia (0,4 - 0,6 mg/kg a cada 24 horas). O comprimido pode ser administrado com ou sem alimentos.

A duração do tratamento varia de acordo com a evolução do quadro clínico e o critério do médico veterinário responsável.

Tabela de orientação da dose	Apresentação		
	Comp. x 3,6 mg	Comp. x 5,4 mg	Comp. x 16 mg
Faixa de peso (kg)			
3,0 - 4,4	½		
4,5 - 5,9		½	
6,0 - 8,9	1		
9,0 - 13,4		1	
13,5 - 19,9			½
20,0 - 26,9		2	
27,0 - 39,9			1
40,0 - 54,9			1 ½
55,0 - 80,0			2

Contraindicações

Não use em casos de hipersensibilidade ao Oclacitinib.
Não use em cães com menos de 12 meses de idade ou menos de 3 kg de peso corporal.
Não use em cães com imunossupressão por hiperadrenocorticismos.
Não use em cadelas gestantes ou em lactação, pois os efeitos do oclacitinib não foram estudados nessas condições nem em machos destinados à reprodução.

Precauções e advertências

O Ocladerm modula o sistema imune e pode aumentar a suscetibilidade a infecções e ao desenvolvimento de papilomas.

Advertências para o usuário

Em caso de ingestão acidental ou intencional, lave a boca, não provoque vômito e procure um médico. Não existe antídoto específico. Aplique tratamento sintomático.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Disque-Intoxicação: 0800-722-6001.

Evite o contato com os olhos. Não coma, beba nem fume durante o uso ou manipulação. Lave as mãos com bastante água depois de manipular o produto. Não reutilize as embalagens vazias. Destrua e descarte as embalagens vazias para evitar a poluição do meio ambiente. Não jogue restos do produto em cursos de água ou rios. Não armazene junto com alimentos, medicamentos para humanos, produtos de higiene, bebidas ou utensílios domésticos. Não armazene em temperaturas superiores a 30 °C. Mantenha na embalagem original fechada, em um lugar seco e fora da luz solar direta. As embalagens usadas devem ser descartadas de acordo com a legislação vigente.

Apresentações

O Ocladerm vem em estojos individuais com bula e blisters contendo 10 - 20 - 30 comprimidos.

 **SENASA** - Certificado N° 21-037.

Est. Elab. N° 4384. Indústria Argentina.

BROUWER S.A.

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD).

Buenos Aires, Argentina.

Tel.: (54 11) 4555-6663.

www.brouwer.com.ar